

306 HISTOIRE NATURELLE

Tænia cordifère, Tænia cordifera.

Un peu cylindrique; les articulations en forme de cœur; le corps filiforme; la tête pointue.

Se trouve dans les intestins du pingoin.

Tænia de l'outarde, Tænia tardæ.

Les articulations rhomboïdales; avec un ovaire d'un côté, et un prolongement membraneux, aigu, et deux fois plus long que les articulations ne sont larges, de l'autre.

Bluch, Eingew. tab. 2. fig. 5, 9. *Batsch*, Bandw. fig. 86, 87. Encycl. pl. 44. fig. 2 à 6.

Se trouve dans les intestins de l'outarde.

Tænia ligne, Tænia linea.

Très-mince; le cou simple; la partie antérieure de la tête pétiolée et globuleuse, ainsi que la tête même; les articulations courtes, larges; l'angle postérieur saillant et aigu.

Goeze, Eingew. tab. 32. A. fig. 8, 12. *Batsch*, fig. 28, 128, 129. Encycl. pl. 47. fig. 19 à 22.

Se trouve dans les intestins des perdrix.

Tænia maculé, Tænia maculata.

Mince, demi-transparent; le bord dentelé; les articulations très-courtes et larges; le tubercule du milieu noir, et l'angle postérieur saillant et aigu.

Bluch, Eingew. tab. 4. fig. 1, 3. *Batsch*, Bandw. fig. 124, 125.

Se trouve dans les intestins de la grive.

Tænia du crapeau, Tænia bufonis.

Antérieurement presque cylindrique, postérieurement filiforme; la tête obtuse; les articulations cylindriques, oblongues, entourées d'une membrane mince, argentée.