

LE CHEZ-NOUS du MARAICHER

Notes culturelles

Sécheresse et binages.

Il en est du binage comme de toutes les excellentes choses, c'est-à-dire, qu'il faut savoir en user avec discrétion. Sous prétexte qu'un bon binage vaut plusieurs arrosages, il ne faudrait pas, cependant, en user, ou plutôt en abuser, lorsqu'il n'y a pas lieu de le faire. Ainsi, on rencontre parfois des producteurs qui binent leur sol en pleine période de sécheresse, alors que sa surface est déjà en poussière sèche. Il faut bien se garder de procéder de cette façon, dans des conditions semblables, car alors le binage ne fait que contribuer davantage à la dessiccation du sol. Entendons-nous bien à ce sujet. Le binage est obligatoire lorsque la surface du sol s'encroûte ou se durcit, ou encore, lorsque les mauvaises herbes commencent à y lever. En temps normal, c'est-à-dire, lorsqu'il pleut assez souvent, les binages s'imposent en nombre suffisant pour maintenir la surface du sol parfaitement ameublie, nette de mauvaises herbes pour lui garder un degré d'humidité convenable. Par contre s'il survient une sécheresse, alors que la surface du sol est meuble, nette et poussièreuse, il faudra se garder de biner inconsidérément. C'est là qu'il faut tenir compte de la texture du sol et bien connaître son pouvoir absorbant. En sol léger ne possédant pas beaucoup d'humus, il faudra alors s'abstenir complètement de biner; autrement, on ne fera que contribuer à le faire se dessécher davantage. Dans tous les autres sols, ayant beaucoup de pouvoir absorbant, le binage ne pourra être profitable qu'à la condition d'être très léger et de n'être pas fait lorsqu'il vente ou pendant la grande chaleur du jour. En résumé, on peut dire qu'en temps de sécheresse, on ne doit biner que lorsqu'on est forcé de le faire, par le durcissement du sol ou son envahissement par les mauvaises herbes.

Au sujet des fraises.

C'est plus que jamais le temps de recourir aux moyens efficaces pour s'assurer d'une récolte abondante et de belle qualité. Au risque d'ennuyer nos lecteurs, nous leur redisons que le fraisier exige beaucoup d'eau pour pouvoir produire beaucoup. Quand il fait sec, il faut les arroser copieusement, aussi souvent que nécessaire, car il ne

Sur quoi placer, et comment

Les valeurs que nous plaçons émanent presque toutes de sociétés industrielles ou de corps publics de la province de Québec.

Dans leurs catégories respectives, elles combinent le maximum de sécurité avec le maximum de rendement.

Elles sont émises en titres, de \$100; de \$500; et de \$1,000; pour vous permettre de réduire vos risques au minimum en divisant votre placement.

Mettre de l'argent dans ces valeurs c'est aider au développement économique du Canada français, qui profitera à chacun de nous.

Versailles-Vitricaire-Boulais, (limitée), Montréal, rue St-Jacques, Immeuble Versailles.

Le "Bulletin de la Ferme"

Rédaction et Administration

111, Côte de la Montagne, (Edifice Morin)
Revue publiée par le "Bulletin de la Ferme" Ltée.
Imprimée par "Le Soleil Ltée."
Téléphone, 2-4297. Case Postale 129

faut pas qu'ils souffrent du tout du dessèchement du sol. Tel que dit plus haut, le binage pratiqué dans une terre nette et meuble, en temps de sécheresse, desséchera plutôt la surface du sol qu'il ne lui donnera d'humidité. C'est pourquoi un arrosage s'impose alors forcément.

Si vous redoutez une sécheresse et que vous soyez dans l'impossibilité d'arroser, vous feriez bien d'appliquer un paillis immédiatement après le binage que vous pourriez donner s'il survenait un orage ou une pluie. Ce paillis doit avoir 3 à 4 pouces d'épaisseur et couvrir tous les espaces libres entre les plants de fraisiers. Non seulement il gardera au sol son humidité, l'empêchera de se durcir et d'être envahi par les mauvaises herbes, mais il permettra encore de récolter des fraises bien plus propres et facilitera la suppression des coullants, par la suite.

Eclaircissage des fruits.

On sait que tout arbre s'épuise, lorsqu'il fleurit abondamment et que ses fruits se nouent et se développent, par la suite, en très grand nombre. C'est ce qui explique pourquoi la plupart des arbres fruitiers laissés à eux-mêmes, ne donnent une bonne récolte qu'à tous les 2 ans. Lorsqu'un arbre est ainsi surchargé de fruits, il ne peut pas leur fournir à tous et à chacun d'eux, la quantité suffisante de sève qu'il leur faudrait pour atteindre leur plein développement. Il en résulte que la production manque d'uniformité, les fruits étant de grosseurs variables, suivant qu'ils sont plus ou moins bien situés ou disposés dans l'arbre. Or, il y a un moyen bien simple d'obtenir à tous les ans, une production régulière de fruits de grosseur uniforme: c'est de pratiquer l'éclaircissage des fruits lorsqu'ils sont suffisamment formés pour pouvoir constater leur écart de grosseur. Ainsi dès que les pommes atteignent un diamètre de 5 à 6 lignes, on enlève alors, en coupant leur pédoncule, à l'aide de ciseaux à bouts ronds, celles qui sont les plus petites, qui sont déformées ou atteintes de piqûres d'insectes, etc., de façon à ne laisser sur l'arbre que des fruits bien formés, bien développés et bien disposés sur l'arbre pour pouvoir se développer à point. Les quantités à enlever varient, évidemment, suivant la production totale de l'arbre. On considère dans le cas des arbres très chargés, qu'on peut profitablement enlever de 1-4 à 1-3 des fruits, suivant les variétés. Il faut bien éviter d'enlever le fruit en l'arrachant de l'arbre, de crainte de briser les organes fruitiers.

A ceux qui prétendent que l'éclaircissage ne paie pas, parce qu'il exige trop de main-d'œuvre, on peut répondre qu'il y a plus que compensation, car non seulement l'éclaircissage assure une récolte annuelle certaine, dans des conditions normales, mais il équivaut en plus à une classification sur l'arbre qui a pour effet non plus d'éliminer les fruits de qualité indésirable, comme on doit le faire lors de la récolte, mais bien de faire profiter les fruits restant sur l'arbre de l'excédant de sève que les fruits de qualité inférieure eussent absorbé, en pure perte, si on les y eût laissés.

J.-H. LAVOIE,

Chef du Service de l'Horticulture.

Nous sommes
acheteurs de

CREME

Que nous payons les meilleurs prix du marché.

Nous raisonnons nos paiements 2 fois par mois

Important: En expédiant votre crème à Québec
plutôt qu'à Montréal, vous sauvez à
peu près 50% sur le coût de l'Express.

Ecrivez ou expédiez immédiatement à

BROOKSIDE DAIRY, Ltd.

Chemin St-Louis, QUEBEC

RAPPORT TELEGRAPHIQUE OFFICIEL SUR LE
MARCHÉ DE MONTREAL

RAPPORT 17 JUIN 1926

Marché de pommes de terre: tranquille.

Pommes de terre du Nouveau-Brunswick, de l'Île du Prince	
Edouard et de Québec, blanches, "A"	\$2.65 à \$2.75 qt.
Pommes de terre de l'Ouest, Canada, "B"	\$2.20 à \$2.30 qt.
Asperges de Québec, 1 doz. pqt de 2 livres	\$3.50 à \$4.00 qt.
Asperges d'Ontario, panier de 11 pts.	\$2.50 à \$2.75.
Laitue Iceberg, cageot	\$5.50 à \$6.50
Tomates du Texas, plats	\$2.00 à \$2.50
Tomates de Floride, cageot de 6 paniers	\$2.50 à \$3.00
Choux, cageot	\$4.50 à \$5.00
Fraises	25 à 30 pe.
Céleri de Californie, cageot	\$14.00 à 15.00
Oignons, Egyptiens, Standard	\$3.00 à \$3.50 qt.

NOMBRE DE WAGONS ARRIVÉS DU 10 AU 15 JUIN INCLUSIVEMENT:

- 2 de pommes de terre de l'Île du Prince-Edouard,
- 7 de pommes de terre du Nouveau-Brunswick,
- 3 de pommes de terre de Québec,
- 3 de pommes de terre du Manitoba,
- 1 de pommes de terre de Saskatchewan,
- 1 de pommes de terre de la Colombie-Anglaise.

IMPORTÉS: 9 de pommes de terre, 20 de tomates, 19 de fraises, 3 de cantaloups, 10 de fruits mélangés, 1 de pommies, 1 de melons d'eau, 16 d'oignons, 15 d'ananas, 21 d'oranges, 32 de bananes, 7 de laitue, 1 de prunes, 4 de citrons, 2 de légumes mélangés, 2 de pamplemousses, 2 de haricots, 2 de carottes, 1 de choux.

J. H. L.

La défense des
cultures

Trois chenilles à combattre

1.—Chenille des gadelliers et grossseilliers:


La chenille vert-bleuâtre des gadelliers est de celles qui s'ingénient à causer de désagréables surprises aux jardiniers. D'une année à l'autre, on oublie trop que le même ravageur revient toujours à la même époque et avec une voracité jamais diminuée. Selon les localités on devrait arroser les gadelliers une première fois entre le 10 et le 20 juin de chaque année et de cette façon, on éviterait tout ennui. Trois cuillerées à soupe d'arséniate de plomb dans un gallon d'eau suffisent pour assurer la destruction des chenilles immédiatement après leur éclosion. Une seule application, faite à temps, a souvent raison de toutes les ravageuses; dans certains cas, il faut parfois avoir recours à une seconde application faite une dizaine de jours après la première.

2.—Chenille verte du chou:

Chaque été les choux et choux-fleurs sont ravagés par la Piéride du chou, chenille vert-foncé, qui dévore les feuilles. Ce sont les larves du papillon blanc si commun dans les jardins pendant la belle saison.

(Suite à la page 451)

"LA BONNE FERMIERE"



La sertisseuse par excellence

La Supérieure à toutes

Pourquoi payer plus lorsque vous pouvez avoir la perfection pour moins d'argent pour fermer les boîtes No 2, 2½ et 4 à \$20.00.

Avec le fameux rebordeur et couteau \$25.00 qui est le seul qui puisse faire un travail des boîtes comme sortant de la Manufacture et comme preuve nous offrons concours à n'importe quelle autre marque de sertisseuse qui ne sera pas équipée avec notre rebordeur.

Prix très intéressants à ceux qui voudront travailler pour nous dans chaque paroisse.

La Fonderie St-Anselme Ltée
St-Anselme Sta. Clé Dorchester

Lisez le Bulletin de la Ferme

La défense de

(Suite de la p.

On peut facilement l'insecte en faisant des poudre insecticide ainsi l'angle parfaitement de plomb en poudre chaux hydratée ou éteinte cette poudre le matin ou c'est-à-dire lorsque les humides; la poudre doit en couche mince, sur la surface des feuilles. Pas d'un soufflet spécial mettre la poudre dans à fromage que l'on frappe au-dessus des plants. La première application viron 2 semaines après nombre des papillons. le milieu de juillet; la tion se fera 3 ou 4 semaines. Quand les papillons sont nombreux, il peut être faire un troisième traitement commencement de septembre ment les cultures sont destruction.

Choux et choux-fleurs ont besoin de traitement application de poudre est parfois nécessaire.

3. — Chenille des

Les rosiers, du moment où ils sont atteints, montrent parfois non équivoques de mildiou certains de la présence de défoliatrices. La défoliation qui se tachent de moins clair à proximité d'une caractéristique du mildiou. On peut alors et cette maladie, en faisant deux applications Bordelaise empoisonner d'intervalle. Le traitement est aussi facile que celui des gadelliers; pour ce qui succès complet est l'application qui s'y prennent tôt et que la maladie se soit taillée pour la défoliation de soufre en poudre d'un grand secours contre l'envahissement; on le saupoudre les feuilles encore humides de manière à ce qu'il adhère.

Concours in

Pour être en parfait état de concours, le conducteur doit avoir le concours dans toute sa machine assez difficile de déterminer les conducteurs absolus parce que, souvent, il faut arriver pour prouver, n'était pas en mesure de bien sa machine.

Il s'est tenu, récemment, un concours très intéressant démontrant l'habileté des conducteurs. Ce concours a permis aux spectateurs de juger de la valeur des diverses voitures.

On a préparé une piste d'obstacles de toutes sortes, souvent juste le passage, de sorte qu'il était souvent forcé de franchir les freins pour détacher ou passer dans une étroite et reprendre la course aussi rapidement que possible.

Dans la seconde classe, de longueur moyenne, a été remporté par M. un "coach" de ligne Griff, qui conduit des voitures a déclaré que la facilité avec laquelle la voiture l'avait aidée la course.

Rien n'engourdit les pires fredaines de