

qu'il faut administrer immédiatement sans perdre de temps. Vous le donnerez en poudre dans du café noir ou dans du sirop de groseilles, dix ou douze heures avant l'accès. Chez l'enfant à la mamelle vous le donnerez soit en lavements, soit en frictions sur la peau. La dose de ce médicament, administré par la bouche, est de 20 à 30 centigrammes chez un enfant âgé de deux ans.

Voilà ce que je voulais dire de la diarrhée sous les différentes formes qu'elle peut revêtir. — *Gazette des hôpitaux.*

De la marche des éruptions dans la scarlatine, la rougeole et la variole.—Clinique de M. GERMAIN SÉE à l'Hôtel-Dieu.

Scarlatine.—La scarlatine débute brusquement par des frissons violents et une fièvre énorme accompagnés ordinairement de vomissements, surtout chez les enfants.

Cette période prodromique ne dure qu'un jour. L'éruption sort dans les vingt-quatre heures, qu'il y ait ou non une angine—car celle-ci n'est pas constante. Elle apparaît d'abord sur le tronc et principalement sur la poitrine, quelquefois aux extrémités, sur les mains, auquel cas on peut être certain qu'il s'agit de la scarlatine.

La durée de l'éruption est de cinq à six jours, et la température tombe habituellement le quatrième ou le cinquième jour de l'éruption, ce qui donne un total de cinq jours de fièvre suraiguë.

Variole.—La variole débute, comme la scarlatine, d'une façon brutale, par un violent frisson généralement suivi de vomissements. La fièvre, qui est suraiguë, atteint son maximum des premiers jours. La durée des prodromes est de trois à quatre jours.

L'éruption commence constamment à la face et pendant au moins vingt-quatre heures on ne voit rien sur le tronc ni aux extrémités. Elle est complète en six ou huit jours, et la fièvre tombe dès que la papulation de la face est faite, c'est-à-dire au bout d'un jour, après une durée totale de quatre jours et demi à cinq jours.

Ce qui précède concerne la variole discrète; dans la variole confluente, la période des prodromes n'est que de deux jours; la fièvre est également suraiguë, mais la durée de l'éruption est définie.

Rougeole.—La rougeole diffère totalement des maladies précédentes. Elle a quatre jours de prodromes, et plus parfois, qui peuvent embarrasser le médecin; tout au plus est-on éclairé par la toux qui survient dans les vingt-quatre heures qui précèdent l'éruption.

Celle-ci se montre d'abord à la face comme dans la variole, et s'effectue en quatre jours.

Quant à la fièvre, dont la marche est graduelle, elle cesse le deuxième jour de l'éruption, après une durée totale de cinq jours en général.

Telle est la manière dont les choses se passent neuf fois sur dix: c'est assez dire de quelle utilité pour le diagnostic est la parfaite connaissance de toutes les indications que je viens de vous retracer très sommairement. — *Le Praticien.*

Hypéridrose des mains et des pieds.—Le *Druggist's Circular* conseille d'humecter les parties une ou deux fois par jour avec un mélange de naphтол 5 parties, glycérine 10 parties, et alcool 100 parties, puis de les saupoudrer avec un mélange de naphтол et d'empois, 2 parties pour 100. — *Méd. and Surg. Rep.*