

**Constipation chez les enfants.**—*Bouchut.*

P.—Podophylline.....	1 grain
Alcool.....	1½ drachmes
Sirup de guimauve pour.....	¼ onces

M.—*Dose* : Une demi cuillerée à thé par jour. — *Revue internationale des sciences médicales.*

**Fissures du mamelon.**—*Dr. J. H. Scarff.*

P.—Baume du Pérou.....	½ drachme
Teinture d'arnica... ..	½ “
Huile d'amandes douces.....	½ once
Eau de chaux.....	½ “

M.—Usage local. — *Maryland Medical Journal.*

**Condylomes.**—*Gregory.*

P.—Calomel.....	30 parties
Acide borique.....	15 “
Acide salicylique.....	5 “

M.—Usage local. — *Revue de thérapeutique médico-chirurgicale.*

**Diphthérie.**—*Simon.*

P.—Acide salicylique.....	8 grains
Huile d'eucalyptus.....	2 drachmes
Glycérine.....	7½ “
Alcool.....	3 “

M.—Usage local. Toutes les heures. — *Revue de clinique et de thérapeutique.*

**Purgatif léger des dyspeptiques.**—*G. Sée.*

P.—Soufre sublimé.....	} 10 parties
Crème de tartre.....	
Magnésie calcinée.....	

M.—*Dose* : Une cuillerée à café une ou deux fois par jour. — *Revue de thérapeutique médico-chirurgicale.*

**Gerçures du sein.**—*Pinard.*

P.—Acide borique.....	6 parties
Eau distillée.....	200 “

M.—Une compresse, pliée en quatre, est imbibée de cette solution et appliquée sur le mamelon. Par-dessus la compresse, on étale un morceau de taffetas gommé et une couche de ouate, et l'on maintient le tout à l'aide d'un bandage de corps.