

THERAPEUTIQUE-CLINIQUE

APHTES. — 1° TRAITEMENT LOCAL : Prescrire de se gargariser toutes les demi-heures avec un demi-verre du mélange suivant :

℞ Borate de soude.....	20 grammes
Glycerine neutre à 30°.....	100 —
Infusé de menthe Q. S. pour.....	1000 c. cubes ou 1 litre
M. s. a.	

Cautériser les ulcérations avec un pinceau chargé de teinture d'iode récemment préparée.

Si la douleur est vive, faire matin et soir un badigeonnage avec la solution suivante :

℞ Cocaïne (chlorhydrate).....	0,10 dix centigrammes
Eau distillée.....	30 grammes

2° — TRAITEMENT GÉNÉRAL. — Régime lacté, eau de Vichy St-Yorre. On modifiera l'état gastrique en administrant le purgatif suivant ;

℞ Sulfate de soude.....	40 grammes
Phosphato de soude.....	10 —
Sirup de cerise.....	40 —
Hydrolat de laitue.....	25j —

à prendre en 2 fois à vingt minutes d'intervalle.

En cas de fièvre, prescrire ;

℞ Sulfate de quinine basique.....	0.60
-----------------------------------	------

En deux cachets à prendre à 2 heures d'intervalle.

ARTHRITE (blennorrhagique).—Recommander le repos au lit.

Dans les formes légères, quand le gonflement et l'épanchement sont peu importants, onctionner la partie malade avec le mélange suivant :

℞ Laudanum de Sydenham.....	20 grammes
Chloroforme.....	20 —
Huile camphrée.....	60 —
M. s. a.	

Dans les formes douloureuses, avec épanchement abondant, le traitement de choix consiste dans l'arthrotomie antiseptique, suivie du lavage de l'articulation. On place un drain et on suture.

L'immobilisation dans l'appareil plâtré expose à l'ankylose ; il vaut mieux ne pas y avoir recours.

BRULURES : Brûlures du 1er degré et du 2e degré. Eviter d'arracher l'épiderme. Piquer les ampoules pour évacuer la sérosité si les brûlures sont peu étendues, on appliquera la pommade suivante.

℞ Analgésine.....	10 grammes
Morphine (chlorhydrate de).....	0,10 centigrammes
Vaseline pure.....	90 grammes
M. s. a.	

Recouvrir d'ouate.

Si l'on ne peut employer la préparation ci-dessus, recourir aux compresses faites avec la solution saturée d'acide picrique (10 à 12 gr. par litre d'eau distillée.)

Au cas de brûlures généralisées toujours très dangereuses à cause des complications viscérales, le malade sera maintenu dans un bain à 35°, il sera mis au régime lacté absolu.

Brûlures des 3, 4 et 5e degrés : Ces brûlures seront pansées avec la gaze au salol. On opérera de manière à éviter les cicatrices difformes.