3º Voie hypodermique:

Todd (1) se basant sur les particularités actives du vératrum viride (déjà, avant lui, Liégeois avait signalé les vertus spéciales de la vératrine comme un médicament hypotenseur — à supposer que le vératrum viride contienne réellement de la vératrine), l'emploie sous forme de teinture à la dose suivante:

Teinture de viratrum viride. III gouttes toutes les 3 ou 4 heures. ou bien le fait entrer dans la formule à préparer suivante:

Teinture de vératrum viride	3 cent. cubes.
Poudre de digitale	} aā 2 grammes.
Poudre de scille	, -
Azotate de strychnine	0 gr. 03 centig.
Poudre de gingembre	4 grammes.

pour 30 capsules:

une capsule suivant les besoins toutes les 4 à 12 heures.

Le vératrum viride, d'après les observations mêmes de Todd, aurait l'avantage sur la trinitrine d'avoir, à côté d'une action semblable, des effets beaucoup plus durables. Par exception, dans l'éclampsie, les doses ci-dessus recommandées pourraient être augmentées (injection sous-cutanée jusqu'à 10 gouttes, renouvelée en cas de besoin).

Le vératrum viride serait, d'autre part, un antidote efficace dans l'empoisonnement par l'o_l m, au même titre que la morphine, par la voie hypodermique, est un moyen précieux de parer aux accidents toxiques provoqués par le vératrum. Mais, en fin de compte, il faudra ne jamais oublier que ce médicament doit être manié avec une certaine prudence.

Traitement général de la sciatique, par le Dr BLANCHON, dans Tablettes Médicales Mobiles, sept. 1911.

Il y a peu de névralgies aussi douloureuses et aussi rebelles que celles qui atteignent le neri sciatique. Aussi les traitements préconisés sont-ils extrêmement nombreux, ce qui prouve l'inconstance de leur efficacité. Le praticien doit cependant connaître

⁽¹⁾ Therapeutic Gazette, feb. 1909; Therapeut. Monatschrift, juli 1909.