

Le talc a des propriétés analogues. Les cas invétérés d'hyperchlorhydrie sont souvent facilement améliorés par l'addition de belladone à la magnésie ou au bicarbonate. Elle diminue l'abondance de la sécrétion gastrique. On peut aussi employer l'atropine.

S'il y a dilatation, on fait des lavages alcalins.

La constipation et l'atonie sont fréquentes. Il faut les combattre par la magnésie ou par une eau purgative le matin.

Lorsque l'hypersécrétion acide est continue, elle finit par amener du spasme du pylore et de petites ulcérations pyloriques avec douleurs continues. Il faut agir de suite et donner avec A. Robin :

Magnésie calcinée	1.50 gr.
Sous nitrate de bismuth	0.25 à .50 gr.
Craie préparée	0.50 gr.
Morphine	0.001 à .002 gr.
Bicarbonate de soude	1 gr.

Pour 1 ou 2 cachets à prendre en une seule fois au début de la crise.

Le soulagement est presque immédiat et on peut donner 4 à 6 doses dans les 24 heures si cela est nécessaire. Si l'on commence à temps, l'amélioration est rapide.

Une grande partie des douleurs ressenties par ces malades est due à la sténose pylorique; leur intolérance alimentaire n'a pas d'autre cause. Si l'intolérance est extrême et que le malade vomit même le lait, on donne :

Picrotoxine	0.05 gr.
Aléose pour dissoudre	.05 gr.
Morphine	0.05 gr.
Atropine	0.001 gr.
Ergotine Bougeau	1 gr.
Eau de laurier-cerise	12 gr.

5 gouttes, 5 minutes avant les prises de lait, sans dépasser 40 gouttes dans les 24 heures. S'il n'y a pas de vomissements, on réduit la picrotoxine à 0 gr. 01.

On conseille encore les lavements d'eau chaude.

J'aime encore mieux le bismuth :

Sous nitrate de bismuth	15 gr.
Poudre d'opium brut	0.10 gr.
Eau gommeuse	60 gr.

1 cuillère à soupe après chaque repas.

Une bonne hygiène, laxatifs fréquents, exercice au grand air (on digère autant avec ses jambes qu'avec son estomac, "Chaumel"). Bains tièdes, lotions tièdes. Lait absolu d'abord, puis oeufs, viande rôtie, hâchée même,