

FORMULAIRE

LARYNGO-TRACHÉITE GRIPPALE :

℞ Baume de Tolu..... } ââ 2 grains.
Acide de benzoïque }
Poudre de benjoin..... 1 grain.
Poudre d'opium brut ½ grain.

Deux à trois pilules par jour.

ARTÉRIO-SCLÉROSE :

℞ Iodure de sodium..... 1 dr. 10 grains.
Sulfate de soude..... ½ dr.
Bicarbonate de soude. 2½ scrupules.
Eau stérilisée..... 10 oz. fl.

Une cuillerée à soupe dans une demi-tasse de lait à chacun des deux principaux repas.

CONGESTION PULMONAIRE ET BRONCHITE CAPILLAIRE GRIPPALE :

℞ Poudre d'ipéca..... 3 grains.
Ergotine 30 grains.
Cognac..... 1½ once.
Julep gommeux, jusqu'à..... 5 onces.

Une cuillerée à soupe de deux en deux heures.

COQUELUCHE :

℞ Naphtaline 6 onces.
Camphre en poudre..... 5 drms.
Essence d'eucalyptus glob..... } ââ 45 grains.
Thérébentine }

Verser sur ce mélange de l'eau bouillante et introduire les enfants dans le local où les vapeurs se répandent pendant une heure par jour.

Gastro-entérite cholériforme des nourrissons.

1. Supprimer le régime lacté, remplacé par eau bouillie non sucrée. Après 24 à 48 heures, on reprend l'administration du lait maternel ou du lait stérilisé, mais en petite quantité.

2. Lavages intestinaux s'il y a fétidité des selles.

3. Trois ou quatre bains à 38° C. par jour.

4. Pas de médicaments à la période aiguë.

(Méry.)