7 onces par jour, alors qu'ils ne devraient prendre, s'ils sont bien portants, que 6 bouteilles contenant 5 onces ¾ de lait, soit 35 onces, à peu près en 24 heures, au lieu de 70 onces et plus ,dans certains cas que nous avons présents à la mémoire.

TRAITEM: IT DE LA DIARRHEE CHEZ LES ENFANTS NOURRIS ARTIFICIELLEMENT AU LAIT DE VACHE.

C'est ici que nous rencontrons la diarrhée infantile sous la forme la plus grave.

Quelle est la conduite à tenir en présence d'un bébé souffrant de diarrhée?

Que les selles soient plus ou moins fréquentes, plus ou moins mauvaises d'aspect, plus ou moins odorantes; qu'il y ait peu ou beaucoup de fièvre; qu'il y ait ou non des vomissements, que la diarrhé date de quelques jours ou plus, le traitement ne varie guère dans ses grandes lignes.

1° Il faut cesser l'alimentation par le lait et le remplacer par de l'eau stérilisée aux heures indiquées, et d'après les quantités données dans le tableau ci-dessus, et continuer cette diète hydrique jusqu'à ce que les selles soient devenues normales, c'est-à-dire durant un ou deux jours.

Il faut savoir, contrairement à un préjugé très répandu, que l'enfant souffre plutôt de boire que de manger, dans ces cas, et que l'eau seule est mieux supportée que le lait qui l'empoisonne.

- 2° En même temps il faut vider l'intestin par un purgatif, de préférence l'huile de ricin, à la dose purgative, ou le calomel à la vapeur, à petites doses répétées: de 1-6 grain d'heure en heure jusqu'à concurrence de 1 grain. Ces purgatifs peuvent être répétés au besoin suivant l'effet.
- 3° Lorsque les selles sont devenues normales, il faut reprendre l'alimentation au lait graduellement, en procédant de la façon suivante:
- (a) On remplace l'eau bouillie par de l'eau de riz, que l'on prépare de la façon suivante: on prend 2 cuillerées à soupe de riz que l'on fait macérer durant 3 heures dans une pinte d'eau à laquelle on ajoute une pincée de sel. On porte ensuite à l'ébullition durant 1 heure, en ayant soin de maintenir au même niveau par