

avis de motion qu'ils proposeront respectivement comme membres de la société MM. les D^{rs} Duquette, Casgrain, Royal, Jeannotte et Cormier.

Le *Dr Foucher* présente un nouveau modèle de polypotôme basé sur l'excision à l'anse froide. Il réclame pour cet instrument les avantages qui suivent :

- 1^o Facilité d'application.
- 2^o Traction directe sans masquer le champ d'opération.
- 3^o Force suffisante pour enlever sans difficulté les plus gros polypes du nez.

Il passe en revue les différents procédés opératoires et se déclare en faveur d'un procédé mixte, dont la plus grande part est accordée à l'excision à l'anse froide, aidée de l'arrachement et de la cautérisation à l'acide chromique.

L'excision est pratiquée pour les portions volumineuses de la tumeur et l'opération peut être prolongée tout le temps que dure l'anesthésie à l'aide de la cocaïne ; quand l'anesthésie cesse, on applique l'acide chromique et la séance opératoire est remise à plus tard.

Lorsqu'il n'existe que de petites portions de polypes situés profondément, l'arrachement à l'aide de petites pinces, suivi de cautérisation à l'acide chromique lui paraît devoir être employé.

Il y aurait peut-être moins de récidives si l'opérateur n'abandonnait un patient qu'après avoir enlevé tout le polype et en avoir cautérisé toutes les attaches.

Le *Dr Brunelle* emploie plusieurs instruments tour à tour, tous sur le principe de l'arrachement ou de l'excision.

Il signale l'utilité du doigt indicateur dans le polype naso-pharyngien.

Le *Dr Rolland* se déclare partisan de l'anse froide qui lui a donné de bons résultats, et il signale les dangers de l'arrachement par torsion, et cite des cas où les cornets ont été enlevés inutilement.

Le *Dr Hingston* ne redoute pas les dangers du procédé par arrachement. L'hémorragie qui en résulte est facile à arrêter. Il signale le danger de la cautérisation, entre autres, les adhérences entre la cloison et la muqueuse des cornets.

Le nouveau modèle de polypotôme présenté à la société lui paraît être une modification importante des instruments du même genre. Il croit cependant qu'il y a disproportion entre le pas de vis et la longueur de l'anse.

En réplique, le *Dr Foucher* ajoute que les différents procédés opératoires restent discutables, et que la guérison pourra toujours être obtenue quoique par des voies différentes. Relativement à la force de