

EPISTAXIS

Par M. le docteur GEORGES LEMOINE



C'EST un symptôme commun à de nombreux états pathologiques et qui consiste en un écoulement plus ou moins abondant de sang par les narines, résultant d'un suintement hémorragique à la surface de la muqueuse pituitaire. L'épistaxis s'accompagne souvent de lourdeur de tête et de symptômes congestifs ; elle peut se répéter plusieurs fois par jour et amener, si elle est abondante, tous les signes de l'anémie aigüe, bourdonnements d'oreilles, pâleur des téguments, petitesse du pouls, tendance aux syncopes. Comme toutes les hémorrhagies. L'épistaxis peut se produire sous l'influence de lésions vasculaires, de modifications de la pression sanguine ou d'altérations du sang ; souvent ces causes s'ajoutent l'une à l'autre.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES.—Pour les établir, il est indispensable de rechercher avec soin la cause de l'épistaxis ; s'il existe une lésion de la muqueuse, angiome, polype naso-pharyngien, etc., il faut recourir à un traitement chirurgical. Des lésions osseuses chroniques amenant des lésions de la muqueuse, comme dans la syphilis tertiaire, demandent aussi un traitement causal. Un coup, un choc produisent des épistaxis abondantes, mais de courte durée. La goutte, les excès de table, le tempérament congestif, la suppression des règles chez la femme, peuvent la produire. Les maladies aiguës ont souvent le même résultat, telles sont la fièvre typhoïde, l'impaludisme, la rougeole, etc. Parmi les maladies chroniques apyrétiques, on signale surtout celles du foie et du cœur, la cachexie rénale, les affections de la rate, l'hémophilie, la leucocythémie, etc. On comprend, par cette énumération incomplète, qu'il est impossible de poser des règles précises de thérapeutique ; le traitement est tout à fait commandé par la nature de la cause de l'épistaxis.

TRAITEMENT LOCAL DE L'HÉMORRHAGIE.—Quelle que soit la cause de l'épistaxis, il faut chercher à l'arrêter pour peu qu'elle se prolonge, sauf dans certains cas sur lesquels je reviendrai. La première chose à faire est d'asseoir le malade dans un endroit frais,