

jannatre. Pieds fauves; base des enisses noires. Ailes: cellule eos-tale d'un jaune pale, un large bord extérieur d'un fauve brunâtre, laissant l'extremité de la cellule sous-marginale de la première postérieure et de la discoidale, et le bord interieur hyalin; nervure terminale de la cellule discoidale perpendiculaire à sa base.

*Conops analis* Fab., Syst. Entem., 175, 3.

Antennae totae atrae. Caput nigrum, ore late flavo, haustello atro, orbita oculorum postica flavo micanter. Thorax niger, utrinque lobo antico linea alba, micanter impressa. Abdominus petiolus elongatus ater; facia ante apicem flava. Ultimum segmentum macula magna dorsali flava. Alæ albo-hyalinae: costa lata nigra. Pedes nigri.

Wied., Aus. Zwei. Ins., ii, p. 237, 5.

Scheitel und Stirn bis zur Fühlerwurzel tief schwarz, wodurch diese Art sich von *costatus* Fabr. leicht unterscheidet, auch ist der Körper überall tiefer schwarz, der obere Rand des Hinterrückens hat nichts Vergoldetes und schimmert kaum an den Seiten ein wenig weisslich-messinggelb. An allem Einsehnitten des Hinterleibes ist mehr weniger Messinggelbes. Auch die Beine schimmern in gewisser Richtung zum Theil messinggelb. Länge 5 Linien. Aus Südamerika.

*C. costatus* Fab. Wied., Aus. Zwei. Ins., ii, 238, 6.

Fühlerwurzel goldgelblich, drittes Glied unten ocherbraun; Augenhöhlenränder messinggelb. Untergesicht und Stirn honiggelb; Scheitel mit schwärtzer Binde, von deren Mitte eine schwarze Strieme zur Fühlerwurzel absteigt und hier gespalten diese Wurzel umfasst. Rückenschild bräunlich-schwarz; Schultern vergoldet und neben ihnen nach innen ein vergoldeter Punkt; Seitenränder des Rückenschildes und eine zu den mittleren Hüftgliedern absteigende Strieme vergoldet, auch an dem hinteren Rande und den Seiten des Hinterrückens ist etwas Vergoldetes. Das Gelbe an den Rändern der ersten Hinterleibsabschnitte reibt sich entweder leicht ab, oder verschwindet bei schnellem Zusammentrocknen, zuweilen scheint es am zweiten zu fehlen, zuweilen auch sogar am vierten vorhanden; der sechste Abschnitt ist in gewisser Richtung überall gelb. Flügel der Länge nach halb braun, Schwingen gelb, mit schwarzen oder schwarzbraunen Kopf-, Schenkel mehr weniger braun. Länge 5 Linien. Aus Südamerika.