

lis globosis calyculatis triangulari-umbilicatis pedunculatis. W.

F. foliis ellipticis, calycibus bifidis, baccis umbilico triangulari. *Lin. suppl.* 441.

F. foliis ovatis obtusis glabris, caule erecto, fructibus umbilico triangulari. *Thunb. diff. de ficu* n. 12.*

F. folio citri obtuso, fructu sanguineo. *Plam. sp.* 21. ic. 132. f. 1.

Nabel-Feige. W.

Habitat in Surinamo. §.

Arbor *superne foliosa*. Folia *alterna petiolata ovalia vix cordata, subtus magis costata, glabra*. Fructus *axillares plures magnitudine baccae Ribis Grossulariae globosi*. Calyx *obtusius bifidus*. Umbilicus *triangularis singulo angulo lacuna oblonga fissio*. Pedunculi *brevissimi uniflori*.

* 30. *FICUS Granatum.*

F. foliis ovatis integerrimis, pedunculis terminalibus geminis horizontaliter divergentibus, receptaculis globosis calyculatis. *Forst. pl. escul.* p. 37. n. 8. *Ejurd. prod.* n. 408.

Granaten-Feige. W.

Habitat in insula Tanna. §.

* 31. *FICUS pumila.*

F. foliis ovatis obtusiusculis integerrimis subtus reticulatis, receptaculis ellipticis pedunculatis, caule ramisque decumbentibus. W.

F. foliis ovato-oblongis obtusis glabris subtus reticulatis, caule decumbente, fructibus pedunculatis. *Thunb. diff. de ficu.* n. 18.*

F. foliis oblongo-ovatis acutis integerrimis subtus reticulatis, caule articulato repente. *Syst. veg.* 774.

F. foliis ovatis acutis integerrimis, caule repente. *Sp. pl.* 1515. *Amoen. acad.* 1. p. 30. *Mill. dict.* n. 8.

Inu-Itabu. *Kaempf. amoen.* 803. t. 804.

Houtt. Linn. Pfl. Syst. 2. p. 546.

Niedrige Feige. W.

Habitat in China, Japonia. §.

* 32. *FICUS erecta.*

F. foliis oblongis acutis integerrimis, subtus reticulatis,