

heure la durée de l'enveloppement. Le traitement est fini en 7 jours.

Ces enveloppements amènent une transpiration plus ou moins abondante et, sous son influence, on voit diminuer la quantité de l'épanchement pleurétique et, non seulement il n'y a pas de diminution dans la diurèse, mais bien une augmentation prouvant que l'exsudat pleurétique est en voie de résorption. Dans la plupart des cas, l'épanchement disparaît ainsi en 7 ou 8 jours.



LES DIARRHEES NON TUBERCULEUSES DES PHTISQUES.

On observe parfois, chez les phtisiques, des diarrhées qui ne sont pas dues à la tuberculose. Elles sont alors causées par une dyspepsie ou une entérite non bacillaire, qui relèvent elles-mêmes de la suralimentation carnée, de l'abus de médicaments (huile de foie de morue, ichtyol, créosote, arsenic) ou de la déglutition des crachats septiques.

On combattra la diarrhée entérique par le régime lacto-farineux, le lait fermenté, les purgatifs salins légers, les lavements, les lavages intestinaux faiblement antiseptiques et, au besoin, par l'ipécacuanha, les sels d'argent, l'opium, la belladone.

On supprimera momentanément la viande dans les cas de diarrhée dyspeptique. On prescrira l'emploi des légumes, des farines, des biscottes, du lait.

On traitera en même temps la dyspepsie. On ordonnera les alcalins à petites doses aux hyperchlorhydriques; la pepsine, la solution chlorhydrique et le suc gastrique naturel aux hyposthéniques.

On recommandera enfin, aux malades atteints d'insuffisance hépatique ou pancréatique, le régime lacté absolu, les sels de calcium et les préparations opothérapiques (pancréatine et extrait de bile).

(*Rivista critica di Clinica medica*, No 23, 1909).



TRAITEMENT DES CONVULSIONS D'ORIGINE GASTRO-INTESTINALES CHEZ LES ENFANTS AU BIBERON

On sait que les convulsions, chez le nourrisson, sont souvent la conséquence de troubles gastro-intestinaux.

Dans ces cas, la première mesure qui s'impose est de mettre immédiatement l'enfant, pendant 24 heures, à la diète hydrique avec de l'eau très pure ou, de préférence, de l'eau de Vittel ou d'Alet: on la donnera par cuillerées à soupe toutes les demi-heures.

D'autre part, on administrera matin et soir un lavement purgatif:

Eau, 150 grammes.

Folioles de séné, 10 grammes.

Faire infuser une demi-heure et filtrer.

Une demi-heure après que le lavement aura été rendu, on donnera un lavement calmant:

Eau distillée, 100 grammes

Bromure de potassium, ââ 60 centigr.

Hydrate de chloral, ââ 60 centigr.

On donnera, en outre, toutes les 3 heures, un grand bain de tilleul à 36 degrés, durant 20 minutes.

Enfin, on pratiquera une injection de 50 grammes de sérum physiologique qu'on renouvellera au besoin dans la journée.

Dès le second jour, si les crises s'atténuent ou disparaissent, on essaiera de donner quelques cuillerées de lait d'ânesse. Enfin, on conseillera l'allaitement au sein d'une nourrice.



TRANSPIRATIONS LOCALISEES DES MAINS

On a combattu par bien des moyens cette forme d'hyperhidrose qui fait le désespoir de bien des sujets et peut même être un obstacle à l'exercice de certaines professions. Dans son petit livre très pratique: *Digestion et nutrition*, M. le Dr Monin conseille la préparation suivante:

Eau distillée d'hamamelis, 500 grammes

Teinture de belladone, 250 grammes

Formaldéhyde, 20 grammes.

Essence de Néroli, 5 grammes.

M. S. A.

Pour badigeonnages, lotions ou compresses.

Voici une autre préparation conseillée pour le même objet par M. O. Martin, dans son *Formulaire*.

Borax, ââ 15 grammes

Acide salicylique, 5 grammes

Glycérine, ââ 60 grammes

Alcool dilué, ââ 60 grammes.

Lotions à faire deux ou trois fois par jour.

M. Monin fait remarquer, en outre, qu'on restreint sensiblement la prédisposition aux sueurs, en prenant, avant chaque repas, dans un peu d'eau (ou mieux dans une tasse de décoction de quinquina gris), 30 à 40 gouttes de teinture de sauge. Cette teinture se prépare en faisant macérer pendant huit jours, dans 100 grammes de vieux cognac, 20 grammes de sommités fleuries de sauge officinale (après ce temps, on passe avec expression). Dans le cas de sueurs nocturnes, on devra répéter, au moment du coucher, la médication qui ne présente d'ailleurs aucun inconvénient.

