

avenir prochain, cette culture aura pris toute l'extension désirable.

Lorsqu'on a, par ailleurs, un excès de fourrages ou de grains, il serait à recommander d'en échanger contre des tourteaux, de la moulée de coton ou de lin que l'on pourrait donner aux animaux en pâture, en même temps que les fourrages verts qui se servent dans des racks portatifs.

Les fourrages verts doivent être coupés plusieurs heures avant d'être servis aux animaux. On les laisse se faner un peu avant de les donner. On évite ainsi la météorisation des animaux.

Il faut compter, par vache d'environ 1000 lbs de poids vif, 110 lbs d'herbe ou de fourrages verts par jour. Un arpent de fourrages verts peut nourrir deux va-

vaches de différentes races et de la valeur de la nourriture qui leur a été donnée. Le coût de la nourriture a été à peu près le même pour la plus mauvaise comme pour la meilleure vache, mais la valeur du lait de la meilleure vache a été de \$61.32, tandis que celle du lait de la plus mauvaise vache a été seulement de \$28.06. Ceci a donné un profit net de \$37.65 pour la meilleure vache et seulement de \$1.55 pour la plus mauvaise.

Ces chiffres démontrent l'importance de tenir un record des différentes vaches du troupeau, afin de connaître celles qui sont gardées avec profit et celles qui payent à peine leur entretien, et de pouvoir éliminer les mauvaises vaches et d'améliorer les troupeaux.

C'est avec une alimentation régulière et abondante qu'on obtient des agneaux une bonne croissance, de la bonne laine et de la bonne viande.


Savez-vous pourquoi plusieurs personnes ont un préjugé contre la viande de mouton? Mais, tout simplement, parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion de manger du bon mouton de qualité succulente et tendre. Fournissez sur le marché du très bon mouton et immédiatement tout le monde en voudra.

Dans la production du porc, n'oubliez pas que les 150 premières livres d'un jeune porc coûtent beaucoup moins cher à obtenir que les 100 ou 150 lbs. suivantes. Tuez les donc à temps, si vous

chies ou épuisés. Les fourrages verts utilisés dans ce but sont surtout la navette, le seigle, le blé d'Inde et les lentilles mélangées d'avoine.

Les béliers réservés à l'élevage doivent passer tout l'été au pâturage et y trouver leur nourriture. C'est le moyen le plus simple de les tenir en bonne santé jusqu'à l'automne, époque à laquelle ils commenceront à recevoir une nourriture riche et abondante.

D'après le "Journal of the Royal Agricultural Society of England," on donne, en France, aux pores et aux volailles, le lait fermenté et même le petit-



VRAI TYPE DE POULE PLYMOUTH ROCK.

chies pendant l'été. Trois arpents pour 5 vaches est un estimé très modéré. Des essais très sérieux aux Etats-Unis ont prouvé qu'en nourrissant les vaches à l'étable exclusivement de fourrages verts, on pourrait tirer, d'un acre de terre, de deux à cinq fois plus de lait que de la même terre en pâture.

Dans cette province, les fourrages verts donnent les meilleurs résultats à ceux qui les cultivent sérieusement, comme nous le voyons par les rapports des Juges du mérite agricole.

**BONNES ET MAUVAISES VACHES**

—A la station agronomique de Peimsvivane, on a tenu compte, pendant 150 jours, de la production du lait de neuf

Un troupeau de moutons demande comparativement moins de soins et de travaux qu'un troupeau de vaches. De plus, là où les vaches ne pourraient qu'être misérables, bien souvent les moutons, moins difficiles, trouveront encore le moyen de vivre à l'aïse et de prospérer.

Si les moutons savent, à l'occasion, se contenter d'une pauvre nourriture ou de pauvres pâturages, cela ne signifie pas qu'il faille les mal nourrir. Au contraire, ils donneront naturellement d'autant plus de profits que leur alimentation sera meilleure.

voulez qu'ils ne mangent pas vos brodts.

Un éleveur de l'île du Prince Edouard écrit dans le "Country Gentleman" que le produit d'un croisement d'une truie "Yorkshire" avec un verrat de la race "Duroc-Jersey" donnera du porc à bacon de qualité absolument supérieure, du "bacon idéal," suivant son expression.

Quand on garde des brebis (et l'on devrait toujours en garder sur une ferme) il faut, en été, suppléer par des fourrages verts aux pâturages dessé-

ché et de la farine d'orge.

**Médecine Vétérinaire**

**CONSULTATIONS**

J'ai un cheval âgé de 8 ans qui, d'a près moi, souffre de la maladie des chevaux, il ne mange pas, la gorge est enflée, il jette beaucoup par le nez, il toussé et paraît avoir beaucoup de difficulté à boire. Y a-t-il des remèdes pour cette maladie? E. M.

"Réponse."—Votre cheval souffre de laryngite. Gardez votre cheval dans une écurie