

de ce médecin à Long Island hospital. Comment s'est introduit le trépan qui certainement s'est développé pendant la vie utérine ? C'est ce que l'on expliquera difficilement. (*New-York Medical journal*, décembre 1871.)

—

**NOUVELLE MÉTHODE DE DESTRUCTION DES CILS DANS LE CAS DE TRICHIASIS OU DE DISTRICHIASIS LIMITÉ, par le docteur P. J. HAYES.**—L'auteur, aux nombreux procédés connus, mais trop souvent impuissants, ajoute le suivant : à l'aide d'une seringue à injection hypodermique il injecte immédiatement au-dessus des culs-de-sac ciliaires quelques gouttes de perchlorure de fer. L'inflammation localisée et modérée par l'application de cataplasmes détermine l'élimination des cils et des follicules. Ce procédé a été tenté deux fois, mais ces observations ne sont pas assez nombreuses pour nous assurer complètement la localisation des phénomènes inflammatoires produits par le perchlorure. (*The Dublin Journal of medical Science*, mars 1872.)

—

**RÉSECTION DU COUDE ET DE L'ÉPAULE SUR LE MÊME BRAS, POUR DES PLAIES PAR ARME À FEU, par le docteur MAC-CORMAC.**—Ce fait, très-probablement unique, de la résection des deux articulations principales d'un membre, a été présenté à la société médicale et chirurgicale de Londres, et l'auteur a pu y soutenir, sans soulever de vives discussions, que le membre du blessé était, malgré la double opération, devenue réellement utilisable pour divers mouvements. (*The Lancet*, 23 mars 1872.)

—o—

#### DECES.

—A Berthier, le 4 Août, à l'âge de cinquante quatre ans, Louis Joseph Moll, M. D. Il pratiquait la médecine dans cette ville depuis près de trente ans.

—A Rigaud, le 31 Juillet, à l'âge de 14 jours, Joseph Raoul Kildare, enfant de G. Madore, M. D.