

Vous m'avez entendu apprécier, dans une de nos précédentes réunions l'application du forceps au détroit supérieur; je vous rappellerai simplement les inconvénients de son emploi : la prise de la tête fœtale est défectueuse, le forceps dérape souvent, les tractions ne peuvent s'exercer suivant l'axe du bassin; on court le risque, enfin, de compromettre non seulement les parties maternelles, mais surtout la vie de l'enfant qui subit une forte compression.

Le professeur Pajot, a comparé le forceps, ainsi appliqué, à un crayon porte-mine, muni de sa virole, (représentée ici par la ceinture pelvienne); plus les efforts de traction sont énergiques plus la virole resserre les deux branches et écrase la tête fœtale, le professeur Farabœuf a fourni des preuves à l'appui, je n'ai pas besoin d'insister sur la gravité des lésions ainsi produites. Vous n'aurez donc jamais recours, je veux l'espérer, Messieurs, à ces applications du forceps au détroit supérieur, ayant à votre disposition un procédé autrement merveilleux: je veux parler de la symphyséotomie. La réapparition et la généralisation de cette méthode, limiteront donc le cas dont je viens de vous parler, qui sont du reste, dans la pratique, de beaucoup les plus fréquents. C'est pourquoi il faut vous rappeler les préceptes que je viens de vous donner qui doivent être ceux de tout bon et consciencieux praticien.

(Lyon méd.)

THERAPEUTIQUE

Traitement de la dilatation de l'estomac.

1° Le malade prendra à chacun de ses repas un des cachets médicamenteux suivants :

Salicylate de bismuth.....	} à 10 gr.
Magnésie anglaise.....	
Bicarbonat de soude.....	

En trente cachets.

2° Prendre le soir, en se couchant, dans un demi verre d'eau une cuillerée à dessert de la poudre suivante :

Follicules de séné passés à l'al-	} à 6 gr.
cool, en poudre.....	
Soufre sublimé.....	} à 3 gr.
Fenouil en poudre.....	
Anis étoilé en poudre.....	
Crème de tartre pulvérisé.....	
Réglisse en poudre.....	2 gr.
Sucre en poudre.....	8 gr.
	25 gr.

3° Prendre chaque jour une douche froide en jet le long de la colonne vertébrale. La durée de la douche ne dépassera pas 15 secondes (si c'est une dame, on devra doucher les pieds avec de l'eau chaude). Friction sèche énergique, après la douche, avec un gant de crin.

4° Suivre avec rigueur l'hygiène alimentaire sui-

vante : mettre au moins sept heures entre les deux principaux repas. Si le malade fait trois repas par jour le premier aura lieu à sept heures et demie, le deuxième à onze heures et demie et le troisième à sept heures et demie. S'il n'en fait que deux, le premier aura lieu entre dix et onze heures et le deuxième à sept heures; ne jamais manger ni boire entre les repas.

Faire prédominer dans l'alimentation les œufs, les féculents, les légumes verts et les fruits.

a) Les œufs seront très peu cuits (crème).

b) Les féculents seront en purée (purée de pommes de terre, de haricots, de lentilles, revalésçière, cacahout, farine lactée, panades, riz sous toutes les formes, pâtes alimentaires, nouilles, macaroni (fromentine).

c) Les légumes verts seront très cuits; (purée de carottes, de navets, de julienne, de petits pois, salades cuites, épinards).

d) Les fruits seront en compote sauf les fraises et le raisin.

Comme pain, prendre du pain grillé. Repousser de l'alimentation le gibier, le poisson, les mollusques, les crustacés et les fromages faits, ainsi que les aliments trop liquides, et en particulier les soupes liquides.

Prendre, au contraire, des soupes épaisses sous forme bouillies au gruau de blé, de riz, de maïs, d'orge et d'avoine.

Pour les boissons, ne prendre qu'un verre et demi (300 grammes) d'un mélange de vin blanc léger avec de l'eau ordinaire; pas de boissons gazeuses, pas de vin pur, pas de liqueurs.

(J. de méd. de Paris.)

Traitement des vomissements rebelles.

M. Albert Robin rappelle un certain nombre de moyens thérapeutiques utiles à connaître.

Il recommande d'abord la *cure de repos absolu*, dans laquelle il faut cesser toute alimentation, la remplaçant par des lavements qui doivent être *alimentaire, désaltérants*.

M. A. Robin prescrit le lavement alimentaire suivant.

Jaunes d'œufs.....	n° 2.
Solution de peptones.....	2 cuillerées à soupe.
Solution de glucose à 10%.....	100 grammes.
Sel marin.....	1 —
Pepsine.....	0gr.50.
Laudanum de Sydenham....	11 gouttes.

Emulsionner le mélange avant de l'employer. On administre un lavement alimentaire toutes les six heures, en le faisant pénétrer aussi loin que possible, à l'aide d'une sonde de Nélaton, le malade étant couché sur le côté. Pendant tout le temps de la cure, le repos au lit est indispensable.

"Pour faire tolérer ces lavements, dit M. A. Robin