

Cette famille, la plus importante de l'ordre, se borne pour notre faune aux 4 genres qui suivent :

Dorsales 3; anales 2;

Menton avec un barbillon 1. *Morrhua*.

Menton sans barbillon. a..... 2. *Merlangus*.

Dorsales 2; anale 1;

Ventrales à rayons nombreux 3. *Lota*.

Ventrales avec un rayon unique à la base 4. *Phycis*.

1. Gen. MORUE. *Morrhua*, Cuvier.

Trois nageoires dorsales, deux anales, les ventrales en pointe. Un barbillon au dessous du menton.

Ce genre, qui forme le type de la famille, comprend 4 espèces dans notre faune.

Première dorsale arrondie postérieurement;

Caudale faiblement arrondie, taille de 2 à 4 pieds... 1. *Americana*.

Caudale presque droite en arrière, taille de 5 à 18 pouces. 2. *ductor*.

Caudale distinctement arrondie, 1ère dorsale à 13 rayons,

plus haute que la 2e 3 *pruinosa*.

Première dorsale échanorée postérieurement 4 *æglefinus*.

1. **Morue d'Amérique.** *Morrhua Americana*, Storer; *Gadus callarias*, Mitchill.—Fig. 16.—Ang. *Cod*.—Long. 2 à 6 pieds. Dos cendré, côtés plus clairs; ventre d'un blanc sale. Pupilles blanches; iris argentés. Tête sans écailles, formant à peu près un cinquième de




Fig. 16.

la longueur totale. Narines doubles, les postérieures plus basses et plus grandes. Mâchoire supérieure s'avancant un peu delà de l'inférieure. Menton avec un barbillon d'environ un pouce de long. Ligne latérale de couleur plus claire que le reste, s'élevant d'abord puis se recourbant en descendant pour ce terminer en ligne droite. Deuxième dorsale un