RENONCULE ACRE, MARGUERITE JAUNE. — Butter Cups, Yellow Weeds.

(Renonculus acris. L.)

Plante très âcre. Tige de 1 à 2 pieds, multissore, creuse glabrescente ou à poils courts demi appliqués, sistuleuse mais non sillonnée.

Feuilles inférieures à pourtour pentagonal, 5 côtés, à lobes en coin, incisées, ordinairement tachées de noir à la base du limbe.

Fleur d'un jaune d'or, à 5 pétales.

s nom-

pantes, nenses.

ne que

le sol.

, Red

2 à 15 rtés, à

nches matre

ans le

le blé

u'elle

eilles.

nt les

mine

s.

La renoncule âcre, vu sa multiplication rapide dans les terrains humides, devient une plante très nuisible en agriculture. Les animaux ne la maugent jamais en herbe. Si cependant les vaches laitières en avalaient mêlée à d'autres herbes, elles en souffriraient au point d'uriner le sang et même de donner du lait rouge. La renoncule gâte les fourrages.

Il suffit souvent pour la détruire d'égoutter profoudément

le sol, de le drainer s'il est nécessaire.

ARGENTINE, POTENTILLE.

(Potintilla. L.)

Plante velue. Tige à stolons grêles, rampants, radicants à chaque nœud.

Feuilles radicales grandes, dentelées, ordinairement soyeuses, argentées en dessous, quelquefois sur les deux faces.

Fleurs jaunes, ovales, à bords ondulés.

Croît dans les terres froides.

Destruction. - Bien égoutter le sol pour le réchauffer.

EUPHORBE, RÉVEILLE-MATIN. - Sun Spurge.

(Euphor be Helioscopia. L.)

Tige fleurie glabre, dressée de 8 à 16 pouces, remarquable par la symétrie de sa végétation. Feuilles éparses. Capsule lisse. Graines rugueuses, d'un brun rouge.

Destruction. — Emploi de la chaux et du sel.