

FORMULAIRE.

Rhumatisme chez l'enfant.—*Lewis Smith.*

- P.—Tartrate de potasse et de soude..... $\frac{1}{2}$ once
 Acétate de potasse..... 2 drachmes
 Sirop de citron.....
 Eau..... à 3 onces
 M.—*Dose* : Une cuillerée à thé toutes les 2 ou 3 heures.—
Leonard's Medical Journal.

Pain pour diabétiques.—*Jeffries.*

- P.—Farine Graham..... 1 tasse
 Meilleur son (échaudé au préalable dans 1 tasse
 d'eau bouillante)..... 1 tasse
 Levain allemand..... q. s.
 Sel..... q. s.
 Lait ou eau..... 1 tasse
 M.—Ce pain contient 17.72 o/o d'amidon, l'équivalent de 19.68 o/o
 de glycose.—*Boston Medical and Surgical Journal.*

Bronchite.—*Schneck.*

- P.—Teinture de veratrum viride..... 15 minimes
 Sirop d'ipécacuanha.....
 Esprit d'éther nitreux..... à 4 drachmes
 M.—*Dose* : 15 gouttes toutes les trois heures pour un enfant de
 un à deux ans.

Pleurésie.

- P.—Nitrate de potasse..... 2 drachmes
 Liqueur d'acétate d'ammoniaque..... $2\frac{1}{4}$ onces
 Esprit d'ammoniaque aromatique..... 2 drachmes
 Teinture d'aconit..... $\frac{1}{2}$ drachme
 Eau distillée..... à 8 onces
 M.—*Dose* : Deux cuillerées à soupe toutes les cinq heures.—
Medical World.

Pleurésie chez les enfants.

- P.—Iodure de potassium..... 32 grains
 Sirop d'iodure de fer..... 1 once
 Glycérine..... 1 "
 M.—*Dose* : Une cuillerée à thé deux fois par jour.—*Medical*
World.

Ptyalisme.—*Gross.*

- P.—Liqueur de sous-acétate de plomb..... 1 drachme
 Eau distillée..... 8 onces
 M.—En collutoire.—*Leonard's Medical Journal.*