

chement est important à faire, à cause des accidents qui peuvent survenir. Après l'expulsion du premier fœtus, la recherche, par un examen attentif, de la présence d'un second fœtus, nous confirmera le diagnostic fait *a priori* auparavant.—*Revue de bibliographie médicale.*

Traitement antiseptique de la vaginite.—Il s'agit du traitement local au moyen des tampons et des irrigations :

1o *Irrigations.*—On les pratiquera avec le spéculum tubaire en injectant doucement, très doucement, le liquide antiseptique et en même temps que l'on retire le spéculum, de façon à mettre toute la surface de la muqueuse en contact avec le médicament.

Le liquide à injecter sera la solution de sulfate de cuivre à 1 pour 100, de thymol, d'acide phénique ou de sublimé à 2 pour 1000, ou bien de quatre cuillerées à bouche par litre du glycéré boriqué suivant :

Acide borique.....	40 parties.
Glycérine neutre pure.....	60 —

F. s. a. et dissoudre à chaud.

2o *Tamponnement.*—On les pratique avec l'ouate hydrophile trempée dans ce glycéré ou bien dans le suivant :

Acide phénique cristallisé.....	1 partie.
Salicylate de bismuth.....	4 —
Glycérine pure.....	40 —
Eau distillée	100 —

Ou bien encore avec la préparation suivante parfois un peu douloureuse à tolérer :

Iodol	2 parties.
Alcool.....	60 —
Glycérine.....	40 —

3o *Balnéation.*—A moins d'indications contraires, bains sulfureux avec injections au moyen du spéculum pendant leur durée et avec l'eau du bain.—*Revue générale de clinique et de thérapeutique*

Les myosites et les cellulites de la cavité pelvienne par CAROLINA WIDERSTROM.—Dans cette affection, le toucher rectal combiné avec le toucher vaginal fait constater de l'empâtement douloureux, de la tuméfaction et de l'épaississement des tissus, tantôt étendus, tantôt limités en forme de nodules. Le siège de ces altérations est variable, Dans certains cas, le tissu adipeux de l'excavation pelvienne est affecté de préférence ; dans d'autres, les lésions pathologiques atteignent les muscles, surtout ceux qui