

TRAVAUX ORIGINAUX

Note sur un cas d'ulcère simple du duodénum,

par L. J. V. CLÉROUX, M. D., Montréal. (1)

N. D. est un homme de 35 ans, a tempérament bilieux, maigre et de stature moyenne. Il a été garçon de ferme depuis l'âge de 12 à 17 ans, puis cordonnier.

À 8 ans, il a eu une variole confluyente, et, à 12 ans, une maladie d'intestins qui se traduisit par de violentes douleurs à l'abdomen durant toute une nuit et nécessita les soins du médecin. Cette dernière maladie dura plusieurs jours. Depuis, il a eu, à la suite de refroidissements, plusieurs attaques de douleurs intestinales.

Chaque année, depuis l'âge de 25 ans, D., a présenté des accès de coliques violentes, survenant après des changements dans son régime alimentaire, particulièrement durant un séjour de quelques jours qu'il faisait chaque été à la campagne.

Cet homme se nourrissait abondamment de viande mais ne faisait pas usage d'alcool. La digestion était accompagnée d'un peu de flatulence, quelquefois de diarrhée, et jamais de vomissements. Pas de brûlure; pas de syphilis; en un mot, aucun antécédent héréditaire morbide.

Samedi, le 18 novembre dernier, à 4 heures du matin, après un souper copieux et une nuit de bon sommeil, D., est pris soudainement de douleurs atroces dans l'abdomen.

Retenu par un autre patient lorsqu'on vient requérir mes soins, et comptant qu'une indigestion pouvait être la cause de telles souffrances, je prescrivis un laxatif. Au bout d'une heure, je me rends chez D., et le trouve très souffrant d'une douleur aiguë qu'il éprouve dans l'hypochondre droit, s'irradiant dans l'hypochondre gauche et dans tout l'abdomen. La pression continue procure du soulagement.

Trois onces d'huile de ricin sont ingérées, puis une dose de *cascara sagrada*, puis un grand lavement; le tout sans effet.

Je pratique le toucher rectal, et ne constate aucune obstruction. La température du rectum est à 99°, le pouls à 90°.

Deux heures après l'administration du lavement, je prescrivis la morphine, ($\frac{1}{2}$ gr. toutes les heures). La première dose diminue

(1) Lue devant la *Société médicale de Montréal*.