chacun, à l'exception de deux, l'écoulement s'est invariablement montré.

Le 28 Septembre, 1868, le sang coula pour la première fois du front et d'un grand nombre de points autour de la tête—représentation frappante de la couronne d'épines du Sauveur—et ceci s'est aussi régulièrement continué depuis.

Le 4 Avril, 1873, une blessure additionnelle, de grande dimension, se montra sur l'épaule droite de Louise, telle que celle que reçut Notre Seigneur en portant sa croix au Calvaire.

Le sang commence ordinairement à couler depuis minuit les jeudis ; quelquefois le saignement du côté ne commence qu'un peu plus tard. A certaines fois, le sang ne coule que de l'une des deux faces, supérieure ou inférieure des pieds, et du dos ou de la paume des mains ; mais souvent aussi il coule de part et d'autre. Le temps de l'écoulement non plus n'est pas uniforme, quelquefois il s'arrête vers quatre ou cinq heures le vendredi après-midi ; d'autres fois il dure quelques heures de plus, mais invariablement il cesse avant minuit du vendredi.

Le premier symptôme du commencement du saignement est la formation d'une ampoule ou vésicule aux mains et aux pieds. Ceci ne commence pas ordinairement avant le jeudi, cependant quelquefois ces vésicules se sont montrées dès le mercredi. La peau extérieure ou l'épiderme, s'élève ainsi de la véritable peau en dessous, continue de s'enfler d'une manière ordinaire, jusqu'à ce que les vésicules atteignent leur entier développement dans la nuit du jeudi. Elles mesurent alors à la surface de la peau environ deux centimètres et demi (un pouce) en longueur, et un centimètre et demi (environ trois cinquièmes de pouce) en largeur. La peau, même des points où elles s'élèvent, est entièrement dénuée de rougeur ou de tout symptôme d'inflammation. Le fluide aqueux qui remplit les vésicules est parfaitement clair et transparent.

Lorsqu'elles sont parfaitement développées, les vésicules crèvent, et le fluide aqueux s'échappe ; et le sang commence alors à couler de la peau proprement dite (*dermis, corium*) en dessous, dans laquelle, cependant, même examinée avec les verres grossissant les plus puissants, on ne peut découvrir aucune piqûre ni scission. La rupture de l'épiderme sur les vésicules, prend une grande variété de formes ; quelquefois une déchirure se montre dans la direction de la longueur, d'autres fois, il s'en produit deux