

commune ; la Couleuvre rayée ; Angl. *The Striped Snake*. Fig. 16.—
Longueur de 24 à 30 pouces. Couleur du dos d'un brun foncé olivâtre,
avec une raie jaune au milieu, s'étendant de l'occiput à l'extrémité de



Fig. 16.

la queue. Sur les côtés, une bande jaunâtre, plus large que la raie du dos ; cette bande quelquefois lavée de roussâtre plus ou moins foncé à son bord supérieur, joint les écailles brunes du dos aux écailles blanchâtres du ventre. Les jeunes individus montrent souvent des taches noires dans le brun du dos, mais ces taches sont à peine visibles sur les spécimens de forte taille. Le ventre est d'un blanc verdâtre, chaque plaque étant marquée d'une tache noire sur son bord postérieur à son point de jonction avec les écailles des côtés. Dans les jeunes individus une semblable tache se montre aussi au milieu du ventre vers le bord postérieur de chaque écaille. Ecaillés oblongues, fortement carénées ; celles du cou plus petites que celles qui suivent, et celles des côtés plus grandes que celles du dos.

Tête allongée, aplatie, recouverte en dessus par 10 plaques, une au museau en avant, suivie de deux autres paires, trois entre les yeux, et deux autres beaucoup plus larges sur l'occiput. La plaque médiane entre les yeux est de forme hexagonale, ayant sa plus grande largeur vers l'extrémité antérieure et se portant de là en forme de coin obtus entre les deux plaques de la paire supérieure du museau. Fig. 17.




Fig. 17.

Narines situées vers le bout du museau, arrondies ; elles sont rapprochées l'une de l'autre et leur pertuis est presque vertical.

Yeux assez relevés au dessus des bords labiaux, courbés et un peu saillants ; pupille noire, iris rougeâtre.

Mâchoires prolongées au delà du crâne en empiétant sur le cou, et susceptibles d'une grande dilatation. Mâchoire supérieure marginée

Fig. 16.—La Couleuvre commune, *Tropidonotus sirtalis*, Latr.

Fig. 17.—Tête de la Couleuvre sirtale laissant voir la disposition des plaques qui la recouvrent.