

soulager le malade et enlever la cause de l'affection. On a conseillé dans le premier cas, les poudres à l'oxyde de zinc ou à l'acide salicylique, les lotions au chloral, à l'acide phénique ou au sublimé, les bains qui, à part ceux d'amidon, sont en général plus nuisibles qu'utiles, et enfin, dans les indigestions, les vomitifs et les purgatifs. Dans le deuxième cas, le traitement varie avec la cause. Avez-vous affaire à un urticaire arthritique, employez une médication appropriée, et en particulier les alcalins. Quant à l'urticaire chronique, c'est là une affection devant laquelle le médecin est souvent désarmé. On calme le symptôme, mais on n'enlève pas la maladie, aussi y a-t-il un desideratum qu'il faut chercher.—*Praticien.*

**Traitement de la laryngite aiguë.**—Le Dr John M. KEATING recommande (*Archives of Pediatrics*) le traitement suivant dans la laryngite aiguë. Pédiluve chaud, l'eau étant à une température telle que la main la puisse facilement supporter, après quoi les pieds sont soigneusement essuyés puis enveloppés dans une flanelle. La potion suivante est ensuite administrée, dans un demi-verre d'eau, par cuillerées à dessert.

Teinture d'aconit.....	3 gouttes
Esprit d'éther nitreux .....	1 drachme
Sirop de seille composé.....	1 " "

Toute la potion doit être prise dans le cours de la nuit. Un mouchoir bien mou est plongé dans de l'eau glacée puis exprimé et appliqué autour du cou que l'on recouvre en outre d'un tissu imperméable ou d'un morceau de flanelle.

Si la toux continue et devient bronchique, il est bon de pratiquer un peu de contre-irritation à la poitrine. L'huile camphrée ordinaire est ce qu'il y a de mieux pour cela. Je recommande encore de petites doses d'huile de ricin qui ont pour effet de décongestionner la muqueuse bronchique.—*Physician and Surgeon.*

**Traitement de la coqueluche.**—M. le Dr ARÉVALO, de Guatemala, où la coqueluche est très fréquente, emploie la formule suivante dans la période catarrhale :

Infusion de polygala.....	120 grammes.
Cochenille .....	0 gr 60 cent
Bitartrate de potasse et de soude.....	1 gr 20 cent
Sirop .....	20 grammes

A prendre par cuillerées d'heure en heure.

Dans la période spasmodique, il fait pratiquer des pulvérisations d'eau phéniquée, avec un vaporisateur, à vingt pas de distance, surtout pendant la nuit, toutes les fois que les accès arrivent, opérations qui arrête fréquemment les quintes de toux.

A cette période, M. Arévalo préconise la préparation suivante qui a été donnée aussi par M. Dujardin-Beaumez :

Bromure de potassium .....	2 grammes.
Bromure de sodium.....	4 —
Bromure d'ammonium.....	2 —