

vessie. Il ne restait plus maintenant pour compléter cette opération qu'à réunir les bords de la grande ouverture qu'avait nécessité l'opération ; ce que le Dr Hingston fit au moyen d'un grand nombre de sutures. Le soir de l'opération le patient passait de l'urine par la plaie, mais la plus grande partie passait par le catheter : le lendemain nous constatons la même chose, mais nous voyions beaucoup moins d'eau couler par la plaie. Deux jours après l'opération le malade urinait par le tube qu'on lui avait laissé et pas une goutte d'urine ne passait par la plaie.

Cet homme quoique d'un âge avancé a parfaitement guéri et laissait l'Hôtel-Dieu, le 5 décembre dernier avec la joie que doit éprouver un patient qui après avoir été privé de ses fonctions urinaires pendant dix-huit ans les retrouve dans quelques jours.

ARMAND HUDON, B. M.,

Interne de l'Hôtel-Dieu.

Hôtel-Dieu, Montréal 1^{er} février 1892.

Clinique du Dr Hingston à l'Hôtel-Dieu

—RAPPORTÉE PAR—

JULES JÉHIN PRUME, B.M.

CAS DE LITHOTOMIE

Le 11 janvier dernier, un homme pouvant avoir une cinquantaine d'années, se présenta à la clinique de M. le Docteur W. H. Hingston, se plaignant de ne pouvoir uriner qu'avec beaucoup de difficulté, quoique les envies d'accomplir cette fonction fussent tout-à-fait normales avec toutefois un peu d'hématurie. Il avait déjà subi trois opérations et ses forces, quoiqu'il fut d'un tempérament robuste, commençaient à l'abandonner.

En effet la verge, présentait trois ouvertures, une près du gland et les deux autres en descendant à une distance de deux pouces l'une de l'autre. Après avoir fait un minutieux examen de la vessie, le Dr Hingston constata la présence d'un calcul vésical et considéra l'opération comme urgente.

Lequel des deux moyens d'extraction du calcul fallait-il employer ? la lithotritie ou la lithotomie ? Ces opérations offrent également des chances de succès et de périls. La lithotritie peut provoquer des spasmes de l'urèthre et de la vessie, des retentions d'urine, de la fièvre urinaire, orchite, et de la néphrite ; ces dangers peuvent cependant être amoindris, la rétention d'urine peut disparaître au passage d'une sonde, les spasmes s'arrêter en prescrivant des bains tièdes prolongés et de petits lavements laudanisés. et la fièvre urinaire cède générale-