

l'article 3 souvent très petit. Corps médiocrement allongé dans les ♀, plus grêle et plus long dans les ♂. Pattes grêles, les 2 postérieures longues, avec les cuisses renflées. Le 4e article des tarses très court et largement échancré en-dessus. Abdomen ovoïde et assez large dans les ♀, avec la tarière souvent aussi longue que lui. Ailes avec une aréole pentagonale mais incomplète par l'absence de l'une, ou même des 2 nervures latérales extérieures. Dans un grand nombre d'espèces, les ailes sont rayées de bandes brunes.

Les Hémitèles sont tous des insectes de petite taille dans notre faune. Leur aréole incomplète est le plus important caractère pour les distinguer des Phygadeuons et des petits Cryptes.

Treize espèces rencontrées, dont une nouvelle ; on peut les distinguer comme suit les unes des autres :

- 1 (20) Ailes hyalines, non traversées de bandes brunes ;
- 2 (11) Pattes rousses ; cuisses postérieures noires à l'extrémité ;
- 3 (6) Scape noir en dessous ;
- 4 (5) Abdomen noir, les segments 2 et 3 obscurément marginés de roux **1. mandibularis.**
- 5 (4) Abdomen roux, le 1er segment seulement noir. **2. scabrosus.**
- 6 (3) Scape roux en dessous ;
- 7 (10) Abdomen noir,
- 8 (9) Hanches noires. **3. parvus.**
- 9 (8) Hanches rousses. **4. caudatus.**
- 10 (7) Abdomen roux. **5. ruficoxus.**
- 11 (2) Pattes jaunâtres ; cuisses postérieures de même couleur ;
- 12 (17) Métathorax absolument inerme ;
- 13 (14) Face noire. **6. ovalis.**
- 14 (13) Face blanche ;
- 15 (16) Flancs roux. **7. semirufus.**
- 16 (15) Flancs noirs. **8. tener.**
- 17 (12) Métathorax à angles subépinaux ;
- 18 (19) Abdomen noir, large. **orbicularis, n. sp.**
- 19 (18) Abdomen varié de roux. **10. subpinosus.**
- 20 (1) Ailes traversées par des bandes brunes ;
- 21 (22) Une seule bande brune aux ailes. **11. humeralis.**
- 22 (23) Deux bandes brunes aux ailes. **12. sessilis.**
- 23 (22) Trois bandes brunes aux ailes. **13. utilis.**