ıs. Il faut de

le tabac cul léger, chaud ine terre. ection, qui pro

en connus au stituent" et 1 out ammonia d'autres ingré leur utilité

On se sert de ces fertilisers en particulier sulfate de our la production de tabac à cigares : 1000 lbs le de chlo e ces engrais à l'acre appliquées conjointement n printemps avec 1500 lbs de tourteaux de er de 500 lbs raines de coton ou de graines de lin suffisent esse initiale pur le besoin des plantes. On distribue ces ieux donne atières à la volée et on les mélange à la terre yen d'engrais r un labour peu profond, opéré une quinzaine de la dose de jours avant la transplantation du plant de n quart de la bac et après qu'une pluie assez abondante a terrain a été en humecté la terre.

On se sert de plus d'un autre fertiliser le erre avant de Mapes tobacco starter " sur les couches et sur soin possible hâter la végétation.

Transplantation du tabac ou Repiquage en

Dès que la terre est bien préparée au prinsante, capablanps, qu'elle a reçu toutes les façons nécessaifacturier dan pour la rendre meuble et bien nette et dès e les gelées ne sont plus à craindre, il faut céder à marquer les rangs destinés à recevoir plants de tabac. La transplantation s'opère rdinaire dans la 2ième ou 3ième semaine du is de juin; on la pratique quelquefois plus d, mais on risque de voir toute la plantation