

latine, la fièvre est toujours très élevée et l'affection est accompagnée d'une angine plus ou moins violente. On ne pourra confondre la rougeole avec une variole commençante, car dans celle-ci les taches rouges présentent à leur centre une vésicule ou une élévation *pointue et dure* qui donne au doigt la sensation d'un grain de sable, et rien de semblable n'existe pour les taches de la rougeole.

Il y a encore la roséole qui se distingue de la rougeole en ce qu'elle ne présente pas des symptômes de catarrhe oculaire, nasal ou bronchique, comme dans la rougeole; outre que la fièvre et les prodromes sont presque nuls dans la roséole, les taches sont plus pâles, plus régulières et plus circonscrites que celles de la rougeole. Enfin la roséole est de courte durée, car ordinairement la guérison s'établit 48 heures après l'éruption.

Messieurs, je pourrais vous entretenir encore longuement sur la rougeole, mais comme dans cette leçon je tenais à vous parler particulièrement des points saillants de la rougeole normale, mais je m'arrête ici, non toutefois sans vous dire quelques mots du traitement. D'abord je vous rappellerai que, règle générale, la rougeole est bénigne, mais n'oubliez pas que parfois elle revêt un caractère grave. Le traitement est hygiénique, mais il est nécessaire que le malade évite le froid, surtout quand l'épidémie sévit en automne ou en hiver. Il est opportun de placer le malade dans une chambre isolée, aérée et dans une demi-obscurité. Parmi les désinfectants recommandés, je vous conseille spécialement la formule suivante :

Sulfate de zinc.....	4 onces
Chlorure de sodium .....	2 onces
Eau .....	1 gallon

En répandre dans la chambre, sur les lits, les hardes, etc., s'en servir, même pour un premier lavage des linges, habits, etc.

Contre la toux, je vous conseille une excellente préparation bien en vogue aux Etats-Unis, savoir :

R—Pot. citr. ....	ʒi
Spt. aeth. nitr.....	ʒii
Tr. opii deod... ..	mxii <i>vel</i> xxiv
Syrupi .....	ʒii
Aquæ .....	ʒii

(Meigs et Pepper)

Une cuillerée à thé toutes les 2 ou 3 jours pour un enfant de 5 ans. Les boissons tièdes et diaphorétiques sont à propos. Enfin, comme tonique et aussi pour combattre le ferment producteur de la maladie, comme dans les affections zymotiques en général, vous prescrirez la quinine.

**Incontinence d'urine chez les enfants.**—Le Dr Eustache SMITH donne une potion ainsi composée : Teinture de belladone, 1 drachme; bromure de potassium, 10 grains; infusion de digitale, 2 drachmes; eau, q.s. pour faire une demi once.—A prendre en une seule dose.—L'auteur ajoute de la strychnine si l'incontinence est à la fois diurne et nocturne. Il a constaté chez les enfants beaucoup de tolérance pour la belladone.—*Analectic.*