

stigma noir
ches. Pattes
érieures avec
le premier
s son milieu
si des acieu-
e blanche à
(1).

tabus cinc-

artie roux.
tentes fili-
scape noir,
en dessous.
x arrondis.
ache pâle à
ompris les
les jambes,
ce les seg-
et; tarière

en le dis-

is, n. sp.

en et les
ent pone-
Antennes
ase seule-
non en-
s angles
s. Ailes
caillettes
ale, poli,
nent aci-
eine sor-

Gen. *PHÆOGENES*, *Wesmael*, pp. 307 et 769.

Aux 12 espèces décrites, ajoutez les 6 suivantes. On pourra les distinguer les unes des autres par la clef ci-dessous.

FEMELLES

- 1(8) Thorax et abdomen, noir ;
2(3) Pattes noires, antennes avec un anneau blanc 6. *aterrimus*, 769.
3(2) Pattes rousses ;
4(5) Jambes postérieures noires avec un anneau pâle, antennes fortes, à articles courts, enroulées 8. *Gaspesianus*.
5(4) Jambes postérieures rousses ; antennes grêles ;
6(7) Tarière à valves très larges, tête fortement renflée en arrière des yeux. 13. *crassitelus*, *n. sp.*
7(6) Tarière ordinaire ; tête ordinaire ; trochanters blancs 14. *recticaudus*, *n. sp.*
8(17) Thorax noir, abdomen plus ou moins roux ;
9(10) Pattes noires, écussons blancs 9. *tuberculifer*, 770.
10(9) Pattes rousses, écussons noirs ;
11(12) Tarière de la moitié de l'abdomen environ ;
12(13) Stigma noir avec une tache blanche à la base 15. *recticornis*, *n. sp.*
13(12) Stigma brun-pâle, sans tache 15. *pinguis*, *n. sp.*
14(11) Tarière à peine sortante ; stigma jaune ;
15(18) Antennes avec un anneau pâle au milieu ;
16(17) Les 4 premiers segments abdominaux roux, le reste noir 1. *hebrus*, 307.
17(16) Le 1er avec les 2 derniers segments abdominaux noirs, les autres roux plus au moins teints de noir. 10. *Falardeaui*, 771.
18(15) Antennes sans anneau pâle ; rousses à la base 11. *orbis*, 771.
19(8) Thorax plus au moins roux ; abdomen roux ;
20(21) Abdomen avec les derniers segments noirs 2. *tuberculifrons*, 308.