

**LE POULAILLER**

PLYMOUTH ROCKS.

Entre toutes les races de volaille celles appelées *Plymouth Rocks*, devraient être les préférés pour la raison qu'elles sont aussi recherchées sur les marchés, qu'elle sont aimées des cultivateurs.

Nous leur donnons aujourd'hui la première place dans notre poulailler, et sommes certain que les éleveurs de volaille font comme nous.

En Canada comme aux Etats-Unis, elles tiennent la même place que les *Dockings* en Angleterre, c'est-à-dire qu'elles sont les premières entre toutes.

Le cultivateur qui désire des volailles pour l'usage général de la ferme ne doit pas choisir les plus grosses; celles de moyenne grosseur sont encore d'une grosseur plus qu'ordinaire et leur seraient plus profitable.

Les qualités prédominantes de cette poule, sont, qu'elle sont plus vite prêtes à pondre et à couver que la plupart des autres races de même grosseur; sont moins sujettes à la maladie que les races plus petites et plus actives, plus aisées à élever que les races asiatiques, moins enclin à courir les champs et détériorer les jardins, que les plus petites. Elles sont reconnues pour pondre à bonne heure, et avec de bons soins on peut être certain d'avoir des œufs sur la fin de décembre, pour le besoin de la maison et pour le marché. De fait, on dirait qu'elles comprennent quand les œufs sont le plus chor, et pondent à temps. Elles sont de disposition tranquille, et rien ne les effraie. Si elles entrent dans la maison, rien autre chose que le balai ne peut les faire sortir.

Certaines personnes désirent élever un oiseau pour s'en faire un favori; à celles-là, nous conseillons d'élever un couple de *Plymouth Rocks*.

**DES POULES ET DES SOINS A LEUR DONNER.**

Si on a le soin de choisir des poulets de bonne race et de les entretenir convenablement, après quelques mois nous aurons des poules qui seront une source de profit et de bien être.

Il est facile d'augmenter la taille et l'abondance des œufs en les nourrissant convenablement. Pour cela il faut leur donner une nourriture variée parce qu'elles se lassent fort vite d'un aliment, fut-il le meilleur. Et de plus puisque l'œuf contient presque tous les éléments constitu-

tifs du corps humain, il faut de nécessité une nourriture variée pour le construire.

Généralement les poules cessent de pondre lorsqu'elles ne sont pas convenablement nourries, qu'elles sont en mauvaises santé ou encore que la température trop basse vient s'ajouter à l'une ou à l'autre des causes précédentes. Il leur faut de toute nécessité un logement chaud en hiver et de la liberté en été. Si la vermine infecte les juchoirs et le poulailler, il faut la faire disparaître immédiatement, parce qu'elle est pernicieuse aux poules, de même que pour tous les oiseaux domesti-

picotté ces os on les pulvérise et on leur en donne de nouveau. Si l'on porte attention à la lutte que les poules se livrent pour manger cette poussière d'os, nous serons convaincus de la nécessité de cette nourriture.

Nous savons tous que pour retirer toutes les propriétés nutritives de la nourriture, il faut de toute nécessité que ces aliments soient broyés, mastiqués. De même, nous savons tous que la poule n'a pas de dents. Il faut donc pour qu'elles puissent digérer leur nourriture, qu'elles aient à leur portée des petites pierres et du gravier où autre

préférable, surtout quand les poules couvent.

Une poule qui glousse, désire couvrir, et si l'on n'a pas besoin de mère, il faut leur faire passer ce désir par tous les moyens à notre disposition. Nous ne pouvons ici donner de moyen infallible sans connaître les ressources à la disposition d'un chacun, cependant il faut les séparer, ôter de sous leur vue les nids, les pailles, et plus principalement le coq.

Un petit nombre de poules dans un poulailler donnent toujours beaucoup de revenu et sont beaucoup plus faciles à entretenir en bonne santé que lorsqu'elles sont en grand nombre. Ceux qui en possèdent beaucoup devraient les tenir dans plusieurs compartiments.

Il faut vendre ou tuer les poules lorsqu'elles sont âgées de trois ans, parceque passé cet âge, elles pondent de moins en moins; qu'elles perdent la santé et ne constituent plus un aussi bon manger quand elles sont plus vieilles, et que en fin de compte, elles sont une source de perte au lieu de donner des profits.

Nous sommes toujours certains de trouver de la vermine dans le poulailler mal entretenu.

Les écailles d'huîtres, contiennent du carbonate de chaux qui est essentiel aux poules qui pondent. Broyez les, et donnez leur en en quantité et vous ne lèverez jamais d'œufs sans écailles.

Quand les volailles sont laissées à elles-mêmes, elles ne pondent que très peu. Si au contraire on en prend bien soin, elles pondront beaucoup plus, et le surplus paiera amplement le trouble et les dépenses extra que l'on aura pu faire.


Quand les volailles de race asiatique deviennent grasses et paresseuses, elles devraient être vendues immédiatement, parceque dans cet état elles ne peuvent reproduire, et la nourriture qu'elles consomment ne rapporte aucun profit.

L'on diffère beaucoup d'opinion sur la manière d'engraisser économiquement les volailles, mais l'expérience nous a démontré, à nous aussi bien qu'à tous les éleveurs, que la meilleure manière et la plus économique, et celle qui peut produire le plus de graisse et la plus forte pesanteur est de commencer à les engraisser du moment qu'ils peuvent se nourrir seuls au temps de la vente.

**PÉRIODE D'INCUBATION.**

L'oie, 30 jours; la dinde, 28 jours; le canard, 28 jours; le paon, 28 jours, le faisant, 24 jours; la poule, 21 jours, le pigeon, 18 jours, et le serin 13 jours.

Abonnez-vous à L'AGRICULTEUR CANADIEN.



ques. Les défections doivent être évitées de temps à autre; pour aucune raison on ne doit les laisser accumuler. Et c'est principalement dans ces mois-ci, que l'on doit prendre le plus de précaution.

Comme la coquille de leurs œufs est composée de carbonate et de phosphate de chaux, il faut leur en procurer; en répandre dans les cours en été, dans le poulailler l'hiver. Sans chercher bien longtemps l'on trouvera ce qu'il leur faut dans les vieux plâtres les écailles d'huîtres, mais plus particulièrement dans les os frais auxquels il reste attaché un peu de cartilage et de viande. Après que les poules ont

chose semblable, qu'elles aient et qui dans leur estomac jouent le rôle de dent. Il n'est pas toujours aisé de détruire la vermine, cependant en soupirant les poules de souffre ou de benzine, et de plus en appliquant une mince couche sur les perchois après les avoir bien lavés de même que le poulailler, on réussit généralement.

Afin de prévenir la vermine ou de la tenir éloignée après que l'on en est débarrassé, il faut renouveler la paille des nids de temps à autre. Un excellent moyen de tenir les nids propres, est de se servir de feuillage de tabac que l'on recouvre de paille ou de foin. La paille est