

FORMULAIRE.

Coqueluche.—*Dr Bruen.*

R.—Quiniæ bromid.....	gr. xvi
Syrup. zingib.....	} aa ʒi
Syrup. simpl.....	

M.—*Dose* : Une cuillerée à thé quatre fois par jour, augmentant, s'il le faut, jusqu'à huit cuillerées.—*Columbus Med. Journal.*

Id.—*Dr W. C. Webb.*

R.—Croton chloral	ʒi
Tr. cardam	} aa ʒii
Glycerinæ	

M.—*Dose* : Une demi cuillerée à thé toutes les quatre heures, pour un enfant de deux ans.—*Medical Bulletin.*

Bronchite chronique des vieillards.—*Fothergill.*

R.—Amm. carb.....	gr v
Spt. chloroformi.....	m xx
Tinct. nuc. vomicæ.....	m x
Infus. senegac.....	ʒi

M.—A prendre toutes les six heures.—*Leonard's Ill. Med. Journal.*

Diarrhée.

R.—Bismuthi subnit.....	gr. LX
Extr. rhaci liquid.....	gtt viii
Syrupi.....	ʒi

M.—*Dose* : Une cuillerée à thé quatre ou six fois par jour.—*Columbus Medical Journal.*

Hémorrhoides.—*Dr W. H. Veatch.*

R.—Acid. carbolicæ.....	} aa ʒi
Glycerini	
Morphiæ sulph.....	gr viii
Aquæ destill.....	ʒii

M.—Injectez de cinq à dix gouttes de ce mélange dans chaque tumeur, et répétez tous les quinze jours jusqu'à guérison.—*Medical Age.*

Chorée.—*Fothergill.*

R.—Liq. arsen. hydrochlor.....	m iii
Tinct. ferri muriat.....	m v
Aq menth. pip.....	ʒii

M.—A prendre trois fois par jour, dans les cas de chorée liée à la croissance.—*Leonard's Ill. Med. Jour.*