

Ci suit la liste de nos principales captures :

N. B.—Les noms précédés d'une astérique sont ceux d'espèces nouvelles déjà décrites, mais non encore publiées ; elles seront décrites à leur rang dans la revue que nous poursuivons des Ichneumonides.

<i>Corimelæna pulicaria</i> , Germar.	<i>Anomalon prismaticus</i> , Nort.
<i>Euschistus tristigma</i> , Say.	<i>Paniscus albotarsatus</i> , Prov.
<i>Eysarcoris carnifex</i> , Germ.	“ <i>canaliculatus</i> , Prov.
<i>Capsus 4—vittatus</i> , Fab.	<i>Limneria hyalina</i> , Prov.
<i>Lygus dislocatus</i> , Say.	“ <i>fusiformis</i> , Prov.
“ <i>lineolaris</i> , Beauv.	“ <i>parva</i> , Prov.
<i>Calocoris rapulus</i> , Say.	<i>Campoplex diversus</i> , Nort.
<i>Nabis Canadensis</i> , Prov.	<i>Cryptus rufus</i> , Prov.
<i>Miris Belangerii</i> , Prov.	<i>Phygadeuon vulgaris</i> , Cress.
<i>Lucidota atra</i> , Fab.	“ <i>subfuscus</i> , Cress.
<i>Ithycerus curculionides</i> , Herbst.	* <i>Hemiteles ruficornis</i> , Prov.
<i>Diplax vicina</i> , Hagen.	* <i>Mesostenus bicinctus</i> , Prov.
<i>Laphria flavicollis</i> , Say.	<i>Mucrus mellipes</i> , Prov.
<i>Anthrax fulvianus</i> , Say.	* <i>Ichneumon hæsitans</i> , Prov.
<i>Dolerus abdominalis</i> , Norton.	* <i>Mesoleptus micans</i> , Prov.
<i>Macrophya niger</i> , Nort.	* <i>Tryphon sanguineus</i> , Prov.
“ <i>incertus</i> , Nort.	<i>Fænus tarsatorius</i> , Say.
<i>Strongylogaster epicera</i> , Say.	<i>Pelopus cyaneus</i> , Linn.
<i>Tenthredo angulifera</i> , Nort.	<i>Sphécodes dichroa</i> , Harris.
“ <i>grandis</i> , Nort.	<i>Tiphia transversa</i> , Say.
<i>Pimpla conquisitor</i> , Say.	“ <i>inornata</i> , Say.
“ <i>inquisitor</i> , Say.	<i>Nomada maculata</i> , Cress. etc. etc.
<i>Odontomerus bicolor</i> , Cresson.	

Comme notre opinion sur la culture du Maclure que l'on poursuit à Bécancour, pour en faire des haies vives, avait paru fort contrarier certains intéressés, nous profitâmes de notre passage dans ces quartiers pour visiter ces plantations. Après avoir examiné bien attentivement les semis de deux ans que M. Rivard possède dans son jardin à Bécancour, nous sommes plus convaincu que jamais que cette culture n'aboutira qu'à un fiasco. Les plants de Mr Rivard mesurent de 8 à 15 pouces, et sont loin, tant ceux qui ont été hivernés dans une cave que ceux qui ont passé l'hiver sur place, de paraître forts et vigoureux. Cette plante est si délicate que même avec le climat des Illinois,