

moins, les orbites antérieurs, l'occiput, les écailles alaires, le dos du mésothorax, avec l'écusson, roux. Antennes longues, à peine enroulées à l'extrémité, brunes avec un large anneau jaune au milieu, le scape avec les articles de la base teints de roux en dessous. Métathorax fortement ponctué, à aréole centrale carrée, rugueuse. Ailes d'un brun foncé, à reflexion violacée, stigma noir avec une tache pâle à la base. Pattes noires; les jambes jaunâtres, les postérieures noires à l'extrémité. Abdomen fort, déprimé, d'un noir uniforme, le premier segment aciculé au sommet, les segments terminaux polis.

Douze spécimens ♀. Le dos du mésothorax est quelquefois tout brun. Espèce très remarquable.

53. Ichneumon Canadensis, Cress. (Ichneumon du Canada).

Ichneumon Canadensis, Cress. Trans. Am. Ent. Soc. I, p. 308, ♀.

Huit spécimens ♀. L'anneau jaune aux pattes est le caractère le plus distinctif de cette espèce, car sa coloration est très variable, le thorax est assez souvent roux, n'ayant du noir que dans les sutures.

57. Ichneumon hœsitans. (Ichneumon hésitant). *nov. sp.*

♀—Long. .43 pouce. Noir et roux; tête rousse, noire en arrière seulement et à l'endroit des ocelles. Antennes fortes, noires, avec un anneau jaune au milieu, le scape roux en dessous. Thorax d'un noir brillant, écusson jaune, les écailles alaires avec le dos du mésothorax en avant, d'un roux ferrugineux. Métathorax à carènes distinctes, l'aréole centrale sub-quadrangulaire, son bord postérieur échancré. Ailes sub-hyalines, nervures brunes, stigma jaune. Pattes rousses; les hanches, les trochantins, les cuisses postérieures excepté à la base, une tache extérieure vers la base des 4 cuisses antérieures avec l'extrémité des jambes postérieures, noir, les jambes sans aucune tache de jaune. Abdomen robuste, en ovale, entièrement roux, excepté le 1er segment noir, n'ayant de roux qu'à l'extrémité, la suture entre les 2e et 3e segments est aussi noire, segments terminaux polis, luisants.

Treize spécimens ♀. Se distingue surtout du *signatipes*, Cress. par la coloration de ses pattes. Var. les cuisses plus ou moins noires; dos du mésothorax noir.

58. Ichneumon seminiger, Cress. (Ichneumon demi-noir).

Ichneumon seminiger. Cress. Proc. Ent. Soc. Phil. III, p. 167, ♀.