

298 HISTOIRE NATURELLE

Tænia moniliforme, *Tænia moniliformis*.

Les articulations arrondies; les ovaires rameux, plus gros à leurs extrémités; la tête arrondie, le cou inarticulé; orifices marginaux solitaires et saillans.

Batsch, Bandw. fig. 59. *Goeze*, Eingew. tab. 26. fig. 1, 4. Encycl. pl. 42. fig. 11, 12, 13.

Se trouve dans les intestins du chat.

Tænia liné, *Tænia lineata*.

Les articulations presque carrées; une ligne blanche longitudinale; les ovaires en forme de sac; le cou contourné.

Batsch, Bandw. fig. 59. *Goeze*, Eingew. tab. 26. fig. 1, 4. Encycl. pl. 43. fig. 1, 2, 3, 4, 5.

Se trouve dans les intestins du chat sauvage.

Tænia filamenteux, *Tænia filamentosa*.

Les articulations quadrangulaires; les orifices se prolongeant comme des fils latéraux; tête ronde.

Goeze, Eingew. tab. 27. fig. 6. *Batsch*, Bandw. fig. 84, 85. Encycl. pl. 44. fig. 1.

Se trouve dans les intestins de la taupe.

Tænia du hérisson, *Tænia erinacei*.

Les articulations courtes, dentées; le cou nul; la tête avec une seule couronne de crochets.

Bloch, Eingew. tab. 6. fig. 1, 2, 3, 7, 8.

Se trouve dans les intestins du hérisson.

Tænia du hamster, *Tænia straminea*.

Le cou simple, très-mince; les articulations quatre fois plus larges que longues.

Goeze, Eingew. tab. 27. fig. 1, 3. *Batsch*, Bandw. fig. 116, 163. Encycl. pl. 43. fig. 15, 16, 17.

Se trouve dans les intestins du hamster.