

## CLINIQUE CHIRURGICALE.

## Des Hernies.

Par M. le Professeur MUNRO.

*Errata.*—Dans le dernier numéro de l'*Abeille Médicale* il s'est glissé une erreur au sujet de la Hernie crurale ; l'on dit que, pour éviter la mort par la division de l'artère obturatrice ou autres, nous avons à suivre la règle de Sir A. Cooper qui nous fait éviter l'artère épigastrique qu'elle soit oblique ou droite. Lisez : il n'existe pas de règle comme dans la hernie inguinale pour nous faire éviter les hémorrhagies et la mort ; car cela est arrivé aux premiers chirurgiens.

## HERNIE OMBILICALE.

L'opération de la hernie ombilicale peut devenir nécessaire même dans les cas de grossesse. D'après mon expérience il y a peu de succès à en attendre ; et il serait à désirer que ceux qui auraient de ces cas en fissent l'autopsie afin de connaître la cause du peu de succès que nous en avons eu, et s'il ne se rencontrerait pas des cas tels que cités dans la hernie inguinale où il y avait plusieurs étranglements, et qui alors nécessiteraient de faire sortir les intestins *afin de diviser les strictures.*

## Gastrotomie ou Ovariectomie.

Par H. A. MATHIEU, Etudiant en Médecine.

La gastrotomie ou ovariectomie est une opération de notre temps et qui demande de notre part beaucoup d'étude avant de pouvoir établir des règles certaines pour tous les cas. On craignait autrefois la péritonite et les hémorrhagies par la lésion des organes tels que le foie, les reins, la rate ; mais aujourd'hui l'on sait que les hémorrhagies ne sont pas de conséquence quand on intéresse le parenchyme, excepté lorsqu'il y a lésion des artères de première classe. Cette opéra-