

7. Короста (*scabies*)

Короста се галапає, подібно як воші, але значно менший. Короста вкопується під пришкірок особливо на тих місцях, де творяться фалди шкіри, бо там їй теплоїше. Отже: межи пальцями на руках, на мошнах, на мужеськім члені здовж пояса, де одне все сильнійше притиснене до тіла і т. д. Під час полових зносин із особою, що має коросту, переходить короста з її полових органів на полові органи здорової особи, вдирається під пришкірок і спричиняє велику сверблячку, більшу вночі, ніж у день, бо вночі отримується тіло під покривалом у ліжку, а в теплій корості усіннійше розвивається під пришкірком.

Коросту можна вигубити стираковою мастию; масти тій треба на один раз ужити 50 — 100 грамів, а втирати треба енергічніше і довше (45 — 60 мін), чим при вушах, щоби масть зазнала під пришкіром. По добі треба взяти легку купіль, треба перемінити біле на собі і на ліжку, а коли сверблячка не уступила цілковито, то треба за кілька днів натирати повторити. Стиракова живиця, якої вживають до приготовлення масти, має властивий запах, для деяких осіб дуже неприємний.

ЗАКІНЧЕНС.

Із того, що було сказано, слідує, що довго управляна онаніє нищить здоров'є безповоротно, а знов заразливі хвороби полові, трипер і твердий прищ (шанкер) зі своїм конеч-