

plaques étendues, mais l'*impetigo figurata* n'est pas la règle ; c'est l'*impetigo sparsa* qui est le plus commun. Les cheveux, malgré la maladie, continuent à pousser et soulèvent les croûtes faciles à détacher de la surface lésée. Ces croûtes restent collées aux cheveux ; elle font songer à une tête souillée de mortier (*impetigo granulata*.)

Cet impetigo est commun avec la phthiriasse. Jadis, on a beaucoup discuté pour savoir qui, des poux ou de l'impetigo commençait. Il n'y a plus de doute : le pou commence. L'enfant pousse se gratte avec ses doigts sales et s'inocule les microbes pyogènes. Les croûtes sont épaisses : excellent abri pour les insectes et leurs œufs. Soulevez la croûte chez l'enfant, même chez l'adolescent, les poux sont sous elle comme les fourmis dans une fourmilière. Et dans ces cas, l'inflammation peut envahir les follicules pileux, même détruire le bulbe et amener la formation de plaques d'alopécie transitoire, parfois d'alopécie définitive.

La présence de l'impetigo sur la face et le cuir chevelu, régions riches en lymphatiques, n'est pas sans avoir quelques conséquences. Les lymphatiques ressentent aisément les effets de cette suppuration superficielle. Les ganglions cervicaux latéraux, même les ganglions sous-maxillaires augmentent de volume ; ils peuvent suppurer. D'autre part, les diverses couches du cuir chevelu sont susceptibles d'être envahies : il en résulte des abcès sous-cutanés qui suppurent et que tous les praticiens sont amenés à ouvrir.

La coexistence d'autres suppurations a été reconnu avant qu'on eût établi l'origine microbienne du mal. La coexistence de suppurations spéciales : tourniolle, coryza, conjonctivite, a été découverte, il y a dix ans, par un médecin de province, le Dr Chaumier. La tourniolle est un petit panaris superficiel sous épidermique autour de l'ongle : l'enfant s'est inoculé par le grattage et avec sa tourniolle s'inoculera en d'autres endroits. Autour du nez, dans le nez existent des lésions suppuratives : d'où un coryza spécial et des croûtes. La conjonctive peut être ulcérée et des troubles de nutrition de l'œil s'en suivre.

Enfin, la muqueuse de la bouche peut être atteinte. MM. Sevestre et Gastou ont décrit une *stomatite impétigineuse* à plaques blanches facilement exulcéreuses, avec staphylocoques.

Le *diagnostic* de l'impetigo est généralement facile.

On ne le confondra pas avec l'*eczéma*, même quand l'*eczéma* est compliqué par lui. La lésion élémentaire de l'*eczéma* est une