



Actualités

Avicoles

Méthode d'alimentation

Recommandée à ceux qui font de la sélection

RATION DE PONTE D'HIVER

L'efficacité d'une ration pour la ponte dépend, à la fois, et de sa composition et de la manière dont elle est distribuée. Le point important est que les poules soient tenues en activité toute la journée. Pour cela, on les soignera peu dans le courant du jour, afin qu'elles grattent diligemment pour trouver le grain dispersé dans la litière. On les nourrira, au contraire, abondamment, le soir, de façon qu'elles aient la jabot bien rempli lorsqu'elles iront se jucher.

La ration suivante réunit les conditions requises pour constituer une nourriture bien équilibrée.

| | | |
|---|--------------------------------|----------------------------------|
| Grains mélangés donnés en petite quantité le matin, et abondamment le soir. | } Blé..... 100 livres | Blé d'inde concassé..... 50 " |
| | | Avoine..... 50 " |
| | | Sarrasin..... 50 " |
| | | Orge..... 25 " |
| | | |
| Bulletin No 4 | } Son..... 100 livres | Gru..... 100 " |
| | | Avoine moulue ou écrasée.. 100 " |
| | | Blé d'Inde..... 50 " |
| | | Tourteau de lin..... 25 " |
| | | Fa. de viande (tankage) 25 " |
| Pâtée sèche, tenue constamment devant les volailles dans des trémies. | } Luzerne ou trèfle haché 20 " | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

On peut aussi laisser constamment la farine de viande à la disposition des pondeuses dans des trémies, et il n'est pas à craindre qu'elles en fassent une trop grande consommation. Il conviendrait cependant de ne pas en abuser, à cause du mauvais goût qu'elle pourrait communiquer aux oeufs.

METHODES D'ALIMENTATION "BULLETIN No 1" F. E. C.

La régularité dans l'alimentation est essentielle, quel que soit le système suivi. Les bons systèmes sont nombreux. Un système qui convient à un éleveur peut ne pas convenir à un autre; c'est donc aux éleveurs de trouver eux-mêmes, par l'expérience, le système d'alimentation qui leur convient le mieux. Ils constateront cependant qu'ils obtiendront de meilleurs résultats en donnant une certaine quantité de grain à l'état moulu. On peut donner cette farine sous forme d'une pâtée humide; ou en trémie, sous forme sèche, si le nourrisseur le préfère.

LE SYSTEME DE TREMIE "BULLETIN No 1" F. E. C.

L'emploi de la pâtée sèche, dans une trémie, s'est beaucoup répandue en ces dernières années, surtout sur les grandes installations avicoles où le problème de la main d'œuvre est difficile à résoudre. Ce système a ses avantages et ses désavantages, mais les premiers l'emportent de beaucoup sur les derniers.

L'inconvénient principal, c'est que les volailles gaspillent de la nourriture en l'éparpillant autour des trémies. On peut éviter ce gaspillage dans une large mesure en se servant de trémies bien construites ou en fermant ces trémies, sauf à certaines périodes régulières.

Les avantages principaux sont les suivants: Il y a économie de temps, parce qu'on n'a pas à préparer de pâtées humides; la suralimentation est moins à craindre car la pâtée sèche est moins savoureuse que la pâtée humide; enfin on économise le grain et on tient ainsi les volailles plus actives, car elles préfèrent le grain rond à la pâtée sèche et grattent leur litière tant qu'il y reste un grain à trouver.

LE SYSTEME DE PATEE HUMIDE—BULLETIN No 1

La pâtée humide donnée quotidiennement était autrefois le système favori des aviculteurs. Beaucoup préfèrent encore cette méthode au système des trémies. Il y en a qui préfèrent donner la pâtée le matin, d'autres à midi, d'autres encore le soir. L'heure importe peu. C'est une question de commodité pour le nourrisseur. Voici quelques désavantages de ce système: Il exige plus de temps et demande plus de régularité que l'alimentation au moyen de la trémie; les troubles de la digestion causés par la suralimentation ou par l'emploi de pâtées mal faites sont plus à craindre. Les avantages sont les suivantes: La pâtée permet d'utiliser commodément les restes de table, les pelures de légumes et les autres déchets de la cuisine. Elle est plus savou-

reuse que la pâtée sèche; enfin c'est un moyen commode d'encourager les poules à manger du trèfle.

Une combinaison des deux méthodes peut être employée avec avantage, surtout pour l'alimentation des poulettes en vue de la ponte. On voit d'après ce que nous venons de dire qu'il ne faut pas nécessairement donner la préférence à une nourriture quelconque. Ce qu'il importe de savoir, c'est qu'il faut absolument fournir toutes les différentes formes de nourriture, céréales, végétales, animales et minérales, mais la composition des rations peut offrir de grandes variations. Les cultivateurs devraient se servir principalement d'aliments cultivés sur la ferme. Lorsqu'ils sont obligés d'acheter, alors qu'ils prennent ces aliments qui coûtent le moins cher et qu'ils peuvent se procurer plus facilement dans les localités où ils demeurent. Une ration qui a donné de bons résultats l'année dernière peut être trop coûteuse cette saison, ou encore celle qui coûtait le plus cher l'année dernière peut être la meilleure marché cette année. Le bon aviculteur doit varier ses rations non seulement d'après les prix des aliments, mais aussi d'après l'état de sa basse-cour; une poule qui ne pond pas ne se trouve pas aussi bien d'une ration riche qu'une poule pondeuse; de même une bande de vieilles poules ne résistent pas aussi bien à une ration riche qu'une bande de poulettes.

L'EMPLOI DU LAIT ECREME COMME ALIMENT. CIRCULAIRE No 21

Valeur comme aliment.—Spillman, du Ministère de l'Agriculture des Etats-Unis, dit que le lait écrémé peut remplacer les os broyés et le bœuf, partout où l'on peut se le procurer. Robinson, dans son "Poultry Craft", dit que le lait écrémé n'a pas d'égal dans l'alimentation de la volaille et que c'est un des aliments les plus économiques au bas prix où l'on peut se le procurer à certaines beurrieres. Atwood de la station de Virginie-Ouest, l'un des meilleurs étudiants des problèmes avicoles, donne au lait écrémé une très haute valeur, à savoir \$1.40 les 100 livres lorsque les œufs se vendent 45 cents la douzaine.

Fermes dans lesquelles le lait écrémé peut être donné.—Le lait écrémé peut être donné doux, sûr ou caillé, ou sous forme de fromage Cottage, mais ces deux dernières formes ne sont pas généralement employées. Il faut qu'il soit donné toujours doux ou toujours sûr; sinon, si on le donne un jour doux et le lendemain sûr, on aura presque sûrement des dérangements des intestins. Les uns prétendent que le lait sûr vaut mieux parce qu'il facilite la digestion; d'autres au contraire donnent la préférence au lait doux. Quoiqu'il en soit, lorsqu'on ne peut pas toujours donner du lait doux, il vaut beaucoup mieux toujours le donner sûr. Un des inconvénients que présente l'emploi de lait écrémé, c'est qu'il, est parfois dans un état avancé de décomposition au lieu d'être sûr lorsqu'il est donné.

Quantité à donner: 13 pintes par 100 poules.

RECOMMANDATIONS GENERALES

1o Tenez le poulailler ouvert toute la journée. OUVREZ, OUVREZ, porte, fenêtre, etc., évitez cependant les courants d'air.

2o Donner aux poules—charbon de bois, gravier, écailles d'huîtres, légumes. Surveillez les "pous". S'il y a des pous, les poules ne pondent pas.

3o Donner de l'eau chaude, dans les jours froids.

4o Une fois par mois, donnez une livre de sel d'epson dans l'eau par 100 poules.

5o Un peu de sel dans les pâtées.

6o Ne gardez pas plus de poules que votre poulailler peut en contenir, par exemple 50 poules dans un poulailler de 15 par 15 ou 30 poules dans un poulailler de 12 par 12, etc.....

7o Une litière de paille de 6 pouces d'épaisseur. Le "secret"; PROPRETE, propreté, propreté, ouvrez, ouvrez, donnez de la propreté animale.

Pour plus amples informations s'adresser au bureau de l'Agro-nome: J. A. Fortin, Batiscan.

Classifiez vos œufs.—Les cultivateurs et autres sont priés de se rappeler qu'il ne leur est plus permis de vendre des œufs non-classifiés. Un inspecteur du gouvernement fédéral, rencontré dernièrement, nous informe que des poursuites seront intentées aux violeurs de cette loi.

Une simple carte postale adressée: Indicateur des Eleveurs de Volailles, Département de l'Agriculture, Québec, qui vous assurera la formule nécessaire à l'inscription dans ce volume, qui contiendra les noms des principaux éleveurs de volailles de la province. Ecrivez aujourd'hui pour la formule.

Mille bébé commence à lire dans les premières pages de l'histoire sainte.

Tout à coup, elle interrompt.

—Alors Adam, il était tout seul, sur la terre, dis maman?

—Oui, ma chérie.

—Ce pauvre homme... Comme il devait avoir peur des voleurs...

LE "BULLETIN DE LA FERME"

Rédaction et Administration
88, Côte de la Montagne
Revue publiée par un comité de techniciens.
Imprimée par "Le Soleil", Ltée.
Téléphone 4297 - - Case Postale 129

Actualités Avicoles

Une pincée de...

Par L. Crevier, Surintendant avicole.

Il est bon que le accès à la cendre de fournaise, dans laquelle on trouvera du gravier de bois et d'autres minéraux dont elles ont

Si nous appuyons et si souvent sur les nos poulaillers, c'est est prouvé que la présence de maladies pance et se développent là où l'humidité

Pour enlever la fiente des plateformes pandre sur celles-ci fines cendres de chaque fois qu'on fait. Il sera préférable de vir de cendres de bois gaspilleront la valeur la fiente comme engrais.

En hiver, la journée d'une poule est raccourcie et, par conséquent, les poules sont inactives plus longue période pose à de fréquents gestifs, à des désordres. Si on ne fournit pas, trique, il faudrait, bonne heure le matin l'après-midi, afin de seaux à travailler plus

Dans la plupart nous constatons que causée par un défaut. Certains pouventillateurs et des ton dans la façade ils sont humides; il manque des prises là où est la défec système. Même d pluvieux, les poula raient relativement munis de prises d'air grandes.

Débarrassez-vous du surplus de stock vous servirez pas reproducteurs au comme pondeuses. Tous les cochets, et poulettes de rebu encore un prix rai les fêtes, surtout sont bien engraisés parées. Dans tous les soient grasses o barrassez-vous en, ainsi des dépenses

Avec une température celle que nous av commencement de de la plus haute bien surveiller la v d'avoir toujours, au ble, à l'intérieur une température u veut dire qu'il faut chasser l'humidité la litière aussi so nécessaire surtout humides, et aussi e tilation par les pris tilateurs et les cad