

la partie céphalitique était seule pigmentée. Faiblement, lobulée, la néoplasie adhérait au limbe scléro-cornéen et n'offrait pas de vascularité anormale. Du côté des ascendants nous n'avons relevé aucune diathèse.

Vu la tendance envahissante de cette production, nous pratiquâmes l'irradiation, et la surface fut touchée vigoureusement au thermo-cautère. La guérison a été rapide et s'est maintenue depuis cinq ans.

Examen Histologique :

A la surface l'épithélium est partout continu formé de 2 à 4 couches de cellules. Au-dessous, stratum conjonctif appartenant au chorion. Plus profondément, la peau est envahie par deux ordres de production, à savoir : cavités kystiques et des amas épithéliaux sous forme de follicule. Sous le derme, tissus cellulaires contenant des vaisseaux et des noyaux embryonnaires, preuve qu'il y avait prolifération. Cette couche séparait complètement le néoplasme de la sclérotique sous-jacente.

Au centre, on aperçoit une grande cavité Kystique dont le diamètre réel ne dépasse pas 1 millimètre ; cette cavité est circonscrite par une première couche interne, où les cellules épithéliales ont subi en partie ou en totalité la métamorphose muqueuse. Plus en dehors, cellules épithéliales conservées, elles-mêmes entourées par une mince couche de tissus conjonctif ; nulle part de membrane basale propre. Sur d'autres points de la préparation, masses analogues, les unes pleines, les autres en voie de métamorphose Kystique. Les intervalles laissés par ces Kystes offrent partout des groupes de cellules épithéliales entourées de minces cloisons conjonctives. Ce qui assigne nettement à ces follicules, le caractère de groupes épithéliaux, c'est d'abord leur disposition folliculaire et l'absence de vaisseaux dans leur intérieur. Leur transformation par places en éléments muqueux achève la démonstration.

En définitive, nous avons eu affaire ici à un épithéliome kystique du limbe à marche envahissante.

Etant donnée l'importance que nous attachons aux petits naevi pigmentaires, nous fîmes chez le sujet d'un an l'extirpation d'une masse mélanique trilobée du volume d'une tête d'épingle ayant pour siège la partie externe du limbe et n'empiétant pas encore sur la cornée.

Cette tumeur comme toutes celles du limbe conjonctival, pigmentées ou non, était du type du carcinome.

Il ressort des observations que nous venons de relater que les épithéliomas semblent avoir comme point de prédilection la limite du