tensité à 5 ou 7 milliampères et l'on pratique deux où trois séances par semaine: la douleur disparait rapidement, les bourgeons saillaats diminuent et ne s'apperçoivent plus, la vascularisation de la sclérotique devient normale. L'iritis chronique avec adhérences a largement profité de cette méthode. Les affections pleurales, les pleurites douloureuses, la pleureusie seche avec frottement et surtout la symphyse pleurale et la scoliose que les récents travaux de physiologie pathologique ont démontré être le résultat d'une symphyse pleurale, ont été traitées avec succès par le sclérolyse électrique. La plèvre est assez facilement atteinte par le courant, car elle est séparée de la peau que par une couche relativement mince de tissus peu conducteurs. Pour appliquer te traitement, on emploie un bain d'eau salée comme anode et le thorax du côté malade est entouré par le cathode, graduellement on élève le courant jusque vers 100 milliampères qu'on laisse passer durant une heure. On fait deux séances par semaine durant un mois, puis une séance par semaine durant deux mois, une tous les quinze jours. Le patient en constate les bons effets après chaque application, les mouve. ments respiratoire augmentent d'amplitude, l'obscurité radioscopique diminue, l'état général, s'améliore et si la maladie a été prise à son debut, on évite la scoliose et le port désagréable des corsets orthopediques.

Pour le traitement des pleurites et des névralgies intercostales l'on remplace l'eau salée uar une solution à 2 pour cent de salicylate de soude, la douleur disparait aussitôt après la première séance. L'ion iode comme l'ion chlore donne d'excellents résultats contre les ankyloses des arthrites. Beaucoup d'autres ions que le chlore exercent une action sclérolytique, en particulier l'ion O H introduit dans les tissus auteur d'une cathode métallique. Ainsi un courant négatif de 5 à 10 milliampères durant 10 à 15 minutes en rapport avec un bougie Béniqué guérit les rétrécissements urétraux les plus rebelles et assouplit les cicatrices les plus dures. Ce même traitement est applicable à tous les rétrécissements des conduits organiques, œsophage, canal nazal, trompe d'Eustache, etc. et surtout aux rétrécissements du col utérin qui sont le cause de si grande douleur.

Le plus grand service que revoit la gynécologie de l'électrolyse c'est en utilisant l'ion zinc qui est le coagulant le plus efficace dont dispose la médecine. Les solutions de zinc sont aussi d'excellents antiseptiques pourvu qu'elles soient en contact avec les surfaces infectes, l'intoxication n'est pas à craindre puisque l'ion zinc ne diffuse jamais.

Avec une solution de chlorure de zinc à 1 pour 100, on a traité avec succès les endométrites, les ulcères chroniques, les fistules anales et les abcès en particulier les abcès tuberculeux. L'une des plus récentes conquêtes de l'électrothérapie c'est son application aux affections cérébrales.

Jusqu'aujourd'hui l'on avait pensé que le cerveau enfermé dans sa boîte cranienne n'était pas accessible au courant et ceux qui professait une opinion contraire était retenu par la crainte de troubler le