

**Le Puffin noir.** *Puffinus fuliginosus*, Strickland; *Nectris fuliginosus*, Bon. *Puffinus cinereus*, DeKay.—Angl. *The Sooty Shearwater*. Long. 18 pouces; ailes 12; bec  $1\frac{1}{2}$ ; tarsi  $2\frac{1}{4}$ ; doigt du milieu  $2\frac{1}{4}$ . Couleur générale brun sale, plus foncé sur la queue et les ailes; dessous brun pâle. . Bec et pattes, noir.

R.—Les Puffins ont les mêmes habitudes que les Pétrils. Ce sont aussi des oiseaux de haute mer. Comme eux, ils battent l'eau de leurs pieds en s'aidant des ailes pour marcher. Le Puffin noir se rencontre assez fréquemment dans le Golfe.

#### IV. Fam. des LARIDES. *Laridæ*.

Bec généralement plus court que la tête, droit à la base et plus ou moins courbé à l'extrémité. Narines linéaires. Cou court; corps compact; ailes longues et pointues. Pattes moyennes, couvertes en avant d'écaillés transversales. Membrane unissant les doigts complète; doigt postérieur petit et élevé.

Bien que les Larides ou Goélants s'aventurent parfois très loin en mer, c'est sur les rivages des eaux salées qu'on les rencontre d'ordinaire. Ils ne plongent pas, mais ils sont d'excellents nageurs! Ils se nourrissent de poissons et de crustacés. Cette famille se divise pour notre faune en 3 sous-familles savoir :

Bec couvert dans sa moitié basilaire d'une peau cornée, distincte du reste, et sous laquelle s'ouvrent les narines..... I. LESTRIDINES.

Bec à couverture semblable dans toute sa longueur; Corps robuste; queue égale..... II. LARINES.

Corps un peu grêle; queue fourchue..... III. STERNINES.

##### I. Sous-fam. des LESTRIDINES. *Lestridinæ*.

Bec fort et très recourbé à l'extrémité, portant une cire membraneuse à sa base. Ailes allongées. Queue en coin avec les 2 pennes du milieu allongées.

Les Labbes ou Stercoraires qui composent cette sous-famille, sont les oiseaux de proie des mers, exerçant leurs brigandages sur différentes espèces de Goélants plus faibles qu'eux. On dit que s'il leur arrive de voir quelque Goé-