

ménorrhéiques; on arrive le plus souvent, guidé par la constatation de ce stigmate, à en trouver d'autres confirmatifs, tels qu'une hémianesthésie sensitivo-sensorielle, des zones hypnogènes, et enfin des guérisons par suggestion.

Diagnostic et traitement du typhus exanthématique. — Le *typhus exanthématique* est une maladie infectieuse, éruptive, existant à l'état endémique dans certaines contrées, et, par suite, susceptible de devenir facilement épidémique, en raison de sa grande contagiosité. En France, le repaire du typhus est la Bretagne, où il a donné lieu à diverses épidémies, toujours rapidement éteintes. En Irlande, il cause chaque année un nombre respectable de décès; et, d'après le Dr COMBEMALE, il ne serait pas rare, dans certaines colonies agricoles pénitenciaires situées sur les confins de la Belgique et de la Hollande. C'est de l'un de ces points certainement que le typhus a gagné, il y a quelques mois, la ville de Lille, où l'épidémie, diagnostiquée et signalée par les médecins, n'a été l'objet d'aucune précaution de la part de l'administration centrale, et cela, nous a appris M. BERGERON à la tribune de l'Académie, parce que le mot *typhus*, inséré dans le rapport, n'avait pas attiré l'attention des membres du Comité consultatif d'hygiène. De Lille la maladie a gagné Paris en passant par Amiens; et peut-être ferait-elle en ce moment son tour de France, si des mesures sanitaires rigoureuses d'isolement et de désinfection n'étaient venues enfin s'opposer à son expansion. Cependant elle n'est pas terminée. De plus, il n'est pas impossible qu'elle revienne d'ici peu. Il est, par suite, important de pouvoir reconnaître le typhus au premier abord, et de ne pas le confondre avec la rougeole, la fièvre typhoïde ou la grippe.

Les symptômes qui permettront, dès le début, de poser le diagnostic sont les suivants: *début brusque, élévation rapide de la température, intensité des symptômes généraux, peu ou pas de symptômes abdominaux.*

Le *début* est généralement d'une brusquerie extrême; parfois, cependant, l'invasion est annoncée par un malaise général. Un frisson violent ouvre souvent la scène, comme dans la pneumonie. En même temps survient une céphalalgie frontale intense accompagnée de vertiges et bourdonnements d'oreilles; la face devient assez rapidement congestionnée, vultueuse, les conjonctives injectées, les yeux larmoyants. Les membres et les reins sont le siège de douleurs et d'une lassitude extrême: les malades sont comme roués de coups.

La *température* s'élève très rapidement, et dès le premier jour elle monte à 39° 5 et 40°, le lendemain, elle est de 40° 5.

Les *symptômes généraux* se montrent dès le début d'une grande intensité; le malade offre de suite le tableau que présente la