

## CHILOSIA, Meigen.

Aux trois espèces décrites, ajoutez la suivante :

**4. CHILOSIA COMOSA** Loew.

♂. Longueur, 10 mm. Noir brillant, avec longue pilosité jaunâtre. Face, d'un noir brillant, avec légère pilosité sur les côtés ; pilosité du front, noire ; antennes rougeâtres, le troisième article brunâtre au sommet. Yeux glabres. Écusson ne portait pas de longues soies noires comme chez les espèces *pallipes* et *cyaneus*. Abdomen noir brillant. Toutes les cuisses, excepté les genoux, noires ; un anneau brunâtre sur les jambes postérieures ; premier article des tarses postérieurs, brunâtre ; le reste jaunâtre. Ailes hyalines ; les nervures et le stigmate, jaunâtre.

Un spécimen mâle rencontré à Saint-Hilaire. Juillet.

Après le genre *Syrphus*, ajoutez le suivant :

## XANTHOGRAMMA, Schiner.

Espèces de moyenne grandeur, noires avec bandes jaunes. Antennes courtes. Face jaune, avec tubercule. Yeux glabres, contigus chez le mâle. Thorax, avec une bande jaune sur les côtés ; écusson, jaune ; sa base noire. Pattes faibles. Ailes semblables à celles des *Syrphus*.

Se distingue particulièrement du genre *Syrphus* par les bandes latérales du thorax.

**XANTHOGRAMMA FLAVIPES**, Loew.

♀. Longueur, 10 mm. Tête d'un beau jaune soufre ; vertex et une bande descendant vers les antennes, noir. Antennes, brunâtres. Surface dorsale du thorax, noir ; une bande jaune de chaque côté ; les flancs, en grande partie, jaune ; écusson, jaune au sommet, noir à la base. Abdo-