vée. En procédant ainsi, leurs feuilles se développeront dès les premiers beaux jours du printemps suivant, et l'on pourra commencer, 15 jours après, la récolte qui ne sera interrompue que vers le milieu de l'été quand elle montera à graine. Pour obtenir des plants vigoureux et non épuisés, la bette, au printemps, est semée en juin, mise à demeure en juillet et cultivée sans récolter la première année.

Variétés:—*Poirée blonde commune, Blonde à carde blanche, Verte à carde blanche, à feuilles vertes de Lyon.*

RHUBARBE

Rheum, L.; Anglais: Rhubarb.

Usage

On emploie les pétioles charnus de la plante pour faire des confitures ou des tartes.

Culture

La rhubarbe se sème en mai-juin, en pépinière, pour être mise en place l'année suivante.

Demande une terre saine et profonde, bien ameublie et fumée. Elle doit être plantée à 3 ou 4 pds de distance en tous sens.

Les plantes peuvent aussi se reproduire par éclats des vieilles touffes; ce moyen est le plus sûr pour multiplier les meilleures variétés: celles ayant les pétioles les plus longs et les plus charnus. Pour hâter la production des jeunes pétioles et les avoir bien tendres, il suffit, dès le printemps, de poser un tonneau défoncé par un bout sur la touffe et l'entourer de fumier chaud. Pour éviter l'épuisement de la plante, il faut supprimer toutes les tiges florales aussitôt qu'elles paraissent.

Variétés:—*Victoria, Mitchell's Royal Albert, Hybride Florentin, Monarque et rouge, Hâtive de Tobolsk.*

CHAPITRE IV

LEGUMES FRUITS

MAIS SUCRE (Blé d'Inde)

Lea Mais, L.; Anglais: Sweet Corn.

Usage

Les épis cueillis avant complète maturité, alors que les grains sont encore laitieux, sont mangés bouillis ou avec sauce au beurre. Cueillis jeunes et confits au vinaigre, ils constituent un excellent condiment.

Culture

Le maïs aime une terre légère, meuble, chaude et fortement fumée. Le semis se fait entre le 15 mai et le 15 juin en rangs espacés de 3 pieds en tous sens par paquets de 5 grains, dont on ne conserve que les 3 plus beaux après leur levée. En semant diverses variétés, depuis les plus hâtives aux plus tardives, la récolte peut être prolongée jusqu'aux gelées. Les soins de culture consistent en binages, arrosages et buttage. On devra biner, même avant

la levée des grains, si la surface du sol s'encroûtait à la suite d'une pluie. Une fois les plants levés et éclaircis, il leur sera très profitable d'être souvent binés jusqu'à ce qu'ils aient atteint environ 1 pd de hauteur, mais opérer au milieu du jour de préférence, attendre que les plants sont alors moins cassants.

Il est également recommandable, quoique pas absolument nécessaire, d'enlever les dragons qui poussent au pied des plants, de même que de les écoumer, afin de hâter la formation des épis.

Variétés:—*Cory hâtif, Crosby hâtif, Bantam doré, Malcolm hâtif, Peep O'Day.*

Tardive, Country Gentleman.

MELON

Cucumis Melo, L.; Anglais: Melon.

Usage

Se mange au commencement du repas pour