

sur une femme affectée de quelque maladie constitutionnelle ou héréditaire.

Le troisième mode est inférieur aux deux modes d'allaitement déjà mentionnés, et le lait de vache est celui généralement en usage, mais son administration nécessite quelques précautions ; ainsi, dans les quinze premiers jours, il convient d'ajouter au lait autant d'eau chaude pour le rendre tiède et moins fort, on y ajoute aussi un peu de sucre, huit cuillerées de ce mélange suffisent à un enfant pour vingt-quatre heures. Après quinze jours on réduit l'eau à un tiers et ne pas en préparer d'avance. Le biberon qui sert à faire prendre ce lait doit être tenu dans la plus grande propreté, un lavage complet chaque fois que l'on s'en sert ; pour cela il est bon d'en avoir deux, afin qu'il y en ait un qui trempe dans l'eau froide, pendant que l'on se sert de l'autre.

(A continuer.)

CONDITIONS GÉNÉRALES DE SALUBRITÉ DES HOPITAUX.

Nous recommandons l'article suivant à messieurs les Conseillers, et dans le cas où l'on se déciderait enfin à construire un hôpital pour les pestiférés, les observations contenues dans cette correspondance mériteraient bien d'être prises en considération :

MM. les Rédacteurs,

Sur votre demande, j'ai fait certaines recherches dans des ouvrages accrédités, sur les meilleures dispositions à prendre dans la construction d'un hôpital au point de vue de l'hygiène.

J'ai l'honneur de vous transmettre sous forme de rapport, celles de ces dispositions qui m'ont le plus frappé, et qui sont le plus recommandées par les personnes compétentes sur ce point.

Le tout est soumis à votre savante critique :

1^o *La situation.*—Un hôpital devrait se trouver en dehors, mais très près des limites d'une ville, ou dans un quartier isolé, sur un terrain sec et élevé ;