

Dendragapus obscurus flemingi sub. sp. nov.

GÉLINOTTE DE FLEMING.

Nommé d'après M. J.-H. Fleming, C.M.Z.S., en reconnaissance des services qu'il a rendus à la science ornithologique, au Canada.

Caractères sous-spécifiques: Comme *Dendragapus obscurus richardsoni*, sans bande terminale à la queue, mais de couleur généralement plus foncée, même que *D.o. fuliginosus*.

D. o. richardsoni.¹

Dos, interscapulaires, et couleur dominante du croupion. Brun-olive au brun

Queue. Brun très foncé. Plumes de la queue taillées nettement à angle droit au bout.

Gorge. Couleur dominante, blanc jaunâtre.²

Côtés de la tête et taches de la gorge. Brun sombre.

Autour du cou sous la gorge. Entre brun jaunâtre et brun olive à brun de gorge avec, parfois, une légère teinte de bleuâtre, passant au fauve en avant à la base du cou.

Estomac et dessous. Gris souris clair.

D. o. flemingi.

Dos, interscapulaires, et couleur dominante du croupion. Gris sombre terne.

Queue. Gris sombre terne. Les plumes de la queue ne paraissent pas avoir cette coupe nette. Les plumes du centre, ainsi que plusieurs des côtés, peu ou assez fortement arrondies au bout.

Gorge. Couleur dominante, d'un blanc pur.

Côtés de la tête et taches de la gorge. Entre gris terne et gris sombre.

Autour du cou sous la gorge. Entre gris sombre et gris très sombre, s'assombrissant à l'avant-gorge jusqu'à un gris sombre terne.

Estomac et dessous. Entre gris sombre et gris très sombre.

Description du spécimen typique. Type, mâle adulte, n° 6651 Musée de la Commission géologique, Département des Mines du Canada. Près du lac Teslin, Territoire du Yukon, 10 octobre 1912. Collectionné par Clement Lewis.

Dos, croupion et queue, gris sombre terne. Les plumes du centre de la queue et quelques-unes des côtés sont arrondies au bout.

Couvertures supérieures de la queue, brun très foncé, finement mais peu vermiculées de brun ardoisé tirant au brun de buffle.²

Scapulaires, ailes et couvertures supérieures des ailes, brun sombre, s'éclaircissant vers le bout de l'aile. Toutes, excepté les rémiges, bien marquées de nuances de couleur de rouille au gris.² Quelques scapulaires tachetées de trainées blanchâtres, s'élargissant au bout avec des taches peu apparentes. Ces dernières se continuant sur quelques-unes des petites couvertures en des taches vagues, et bordées étroitement.

Dessous, du gris sombre au gris très foncé, et se noircissant postérieurement par de petites taches au bout des plumes qui se marient au blanc des couvertures inférieures de la base de la queue.

Les plumes de la parties inférieure de l'estomac ayant des lignes blanches en forme de flèches et s'élargissant vers les flancs et postérieurement, où elles se changent, à l'extrémité, en des taches larges, des barres et des raies. Des vermiculures prononcées de brun de buffle² et de gris envahissent la couleur dominante du bout des ailes sur les côtés.

¹ Les noms des couleurs, sauf indication contraire, sont tirés de "Colour Standards and Nomenclature", éd. de 1912.

² Ces noms de couleurs ne sont pas empruntés à "Ridgway's Colour Standards.