

4 mai. Déchirure du périnée au 2e degré — suture. — L'enfant, un garçon, pèse 7 lbs.

Suites des couches parfaitement physiologiques.

Vous remarquez donc un travail long, laborieux d'une durée de 68 heures, se terminant heureusement pour la mère et l'enfant sans application de forceps.

---

OBSERVATION II. — Lina, notre seconde parturiente, est une servante âgée de 18 ans, et jouissant d'une santé parfaite. Chez elle le travail se déclare à 8 hrs du soir, le 8 mai, et cependant elle n'est qu'au début du neuvième mois de sa grossesse. Les membranes se sont rompues dans le courant de l'après-midi, c'est-à-dire qu'il y a eu rupture prématurée des membranes. Le 9 mai à 6 hrs a.m., le col est complètement effacé, et la dilatation grande comme un 5 cents.

Les contractions sont très fortes, se succèdent rapidement, la dilatation s'achève promptement à 9 hrs a.m. Le périnée est rigide et oppose une barrière infranchissable à la tête qui bute sur lui. La parturiente sous l'impulsion des douleurs violentes fait des efforts inouis pour se débarrasser de son fœtus dont la tête est cependant petite. A 9 ½ hrs a.m., le liquide amniotique se teinte de mœconium et sur le cuir chevelu on remarque parfaitement ce produit de l'intestin du fœtus. Je termine rapidement l'accouchement par une prise directe du forceps. L'enfant, une fille, naît en état de mort apparente et ne pèse que 5 lbs 9 onces. L'enfant se ranime rapidement à l'aide de la respiration artificielle (méthode de Schlutze). Suites des couches normales.

---

OBSERVATION III. — Notre troisième malade, Justine, est aussi servante et âgée de 21 ans. Si ses antécédents héréditaires ne sont pas fameux, elle jouit par contre d'une santé excellente. Sa mère est paralysée; son père souffre de rhumatisme; une de ses sœurs est morte pendant des suites de couches. Elle-même n'a jamais eu que la rougeole.