

PHARMACOLOGIE

Bourdonnements d'oreille.

Traitement local. — Soigner, avant tout, l'affection locale causale: otite moyenne aiguë, adhérences de la caisse, etc.

Dans les cas intenses et rebelles, injections par la trompe de solutions de cocaïne à 2, puis 4 et jusqu'à 10 %, répétées tous les trois ou cinq jours (BAUMGARTEN).

Si les bruits persistent, recourir au besoin à l'application de *petits vésicatoires sur la mastoïde*.

Traitement général. — Il suffit, le plus souvent, chez les sujets névropathes.

Bromure de sodium seul (1 gr. 50 ou 2 gram. par jour, en une fois, dans un peu d'eau sucrée, une heure avant le coucher) ou associé aux autres bromures ou à l'antipyrine:

Bromure d'ammonium.....	2 gram.
— de potassium.....	4 —
— de sodium.....	4 —

Pour un paquet à dissoudre dans 750 grammes d'eau minérale carbonique (ERLENMEYER).

Prendre une à trois doses de 100 cc. de cette solution par jour. Ne pas continuer pendant plus de trois semaines.

Prendre ensuite une dose unique de 1 gr. 50 à 2 gram., le soir des jours où les bourdonnements seront les plus marqués.

Ou:

Antipyrine.....	6 gr. 20 centigr.
Bromure de sodium.....	1 — 50 —

Pour un paquet n° 10: une paquet tous les soirs, dans un peu d'eau sucrée, avant de se coucher.

Teinture d'aconit, II à X gouttes par jour pendant une ou deux semaines.

Teinture d'arnica, V à VII gouttes chaque fois, deux ou trois fois par jour, sur un morceau de sucre (GRUBER).

Traitement des complications. — Si les vertiges accompagnent le bourdonnement :

Chlorhydrate de quinine.....	1 gram.
Extrait de gentiane.....	Q. s.
Poudre de guimauve.....	Q. s.

Pour dix pilules: une pilule trois fois par jour. En cas d'insuccès: