

Julie accouche le 27 mai après un travail de dix-huit heures. Les suites de couches sont normales et la température ne s'élève pas d'un dixième de degré.

OBSERVATION XIV.—Zozime, femme, âgée de 27 ans, entre à la Maternité le 10 octobre 1895. Elle est enceinte pour la quatrième fois, et doit accoucher vers le 10 novembre. Ses grossesses antérieures ont été très pénibles; elle a souffert constamment de vomissements: ses accouchements ont été très laborieux deux fois ont été obligé de lui appliquer les forceps. Son dernier accouchement a été long mais l'enfant est venu par les seuls efforts de la nature.

Quand elle entre à la Maternité elle se plaint d'*enflure* aux pieds et aux mains, l'étourdissements fréquents, de maux de tête intolérables, d'insomnies continuelles, et elle ne va à la garde-robe que tous les quatre ou cinq jours.

Les urines contiennent quinze grammes d'albumine au litre.

Nous soumettons cette malade au régime lacté absolu et nous donnons le bitartrate de potasse (deux drachmes) tous les matins, et le chloral (grs xv) associé au bromure de potasse (trente grains) tous les soirs au coucher. Comme le sommeil ne se produit pas avec ces deux derniers médicaments et que la céphalalgie continue aussi violente, nous donnons tous les soirs une seconde dose de chloral et de bromure à une heure d'intervalle de la première. Nous obtenons ainsi une amélioration assez marquée, mais nous sommes obligé de continuer ce traitement jusqu'à l'accouchement, qui se fait le 11 novembre, à 8½ heures du matin. Il n'y a rien d'anormal dans les suites de couches.

OBSERVATION XV.—Notre troisième observation touchant le chloral se rapporte à Ancilia, fille, primipare, 18 ans. Inutile d'entrer ici dans des détails de symptômes dont le plus important et presque l'unique est une céphalalgie frontale revenant par exacerbation matin et soir. L'urine présente à l'analyse 8 grammes d'albumine. Comme Ancilia ne veut pas prendre de lait, qu'elle ne veut pas se soumettre à aucun régime, qu'il lui faut *manger* et *boire* comme les autres, qu'elle n'a confiance qu'aux remèdes, nous lui prescrivons le chloral (grs xv) et le bromure (20 grs) à prendre matin et soir. Elle accouche heureusement un mois et demi après son entrée à l'Hospice.

* * *

Ménager à employé une fois le lactate de Strontium à la seconde grossesse d'une femme qui avait eu douze accès d'éclampsie à sa première grossesse. Il dit s'en être bien trouvé.

* * *

Pour prévenir l'attaque d'éclampsie imminente, quelques médecins ont employé la *Pilocarpine* en injection hypodermique à dose de $\frac{1}{4}$ grain à $\frac{1}{2}$ gr. Elle produit une diaphorèse excessive, mais elle n'est pas sans danger. Nous nous souvenons de l'avoir employée une fois dans un cas de *malaria* et nous en avons eu tant de mauvais résultats que nous nous sommes promis de n'y plus retourner. Il vaut mieux le remplacer par les bains chauds, les bains de vapeur suivis de l'enveloppement dans un grand nombre de couvertures. La sudation produite par les bouteilles d'eau chaude est d'un grand secours.